

Aus der Frauenklinik der Universität Würzburg  
Direktor: Professor Dr. K. Burger

---

ZUR FRAGE DER SECTIO CAESAREA NACH VORAUSGEGANGENER  
=====

GEBURT PER VIAS NATURALES  
=====

(Bericht über die Fälle der Universitäts-  
Frauenklinik Würzburg aus der Zeit vom  
1.1.1925 - 31.12.1952)

I n a u g u r a l       -       D i s s e r t a t i o n

verfaßt und der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Julius - Maximilians - Universität Würzburg

zur

Erlangung der medizinischen Doktorwürde

vorgelegt von

Ruth H i r s c h b e r g

aus Oberhausen-Sterkrade

Würzburg 1957







Digitized by the Internet Archive  
in 2026

[https://archive.org/details/IA40153517\\_0162](https://archive.org/details/IA40153517_0162)

Aus der Frauenklinik der Universität Würzburg  
Direktor: Professor Dr. K. Burger

---

ZUR FRAGE DER SECTIO CAESAREA NACH VORAUSGEGANGENER

=====

GEBURT PER VIAS NATURALES

=====

(Bericht über die Fälle der Universitäts-  
Frauenklinik Würzburg aus der Zeit vom  
1.1.1925 - 31.12.1952)

I n a u g u r a l       -       D i s s e r t a t i o n

verfaßt und der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Julius - Maximilians - Universität Würzburg

zur

Erlangung der medizinischen Doktorwürde

vorgelegt von

Ruth H i r s c h b e r g  
aus Oberhausen-Sterkrade

Würzburg 1957

Referent: Professor Dr. med. K. B u r g e r

Tag der mündl. Prüfung:  
8. Mai 1967.

Gedruckt mit Genehmigung der  
Hohen Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg

Meinen lieben Eltern  
in Dankbarkeit  
gewidmet

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                    | <u>Seite</u> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| A) Einleitung                                                      | 1            |
| B) Arbeitsmethode                                                  | 1            |
| C) Kasuistik                                                       | 3            |
| Fälle mit einmaliger Sectio:                                       | 3            |
| I. Vorwiegend mütterliche Indikation                               |              |
| II. Vorwiegend kindliche Indikation                                |              |
| Fälle mit wiederholter Sectio:                                     | 33           |
| I. Vorwiegend mütterliche Indikation                               |              |
| II. Vorwiegend kindliche Indikation                                |              |
| D) Die der Sectio vorangegangenen Geburten<br>per vias naturales   | 43           |
| E) Indikation zur Sectio nach vorausgegangener<br>vaginaler Geburt | 48           |
| F) Postoperativer Verlauf für Mutter und Kind                      | 59           |
| G) Zusammenfassung                                                 | 63           |
| H) Literaturverzeichnis                                            | 64           |

Zur Frage der Sectio caesarea nach vorausgegangener Geburt  
=====

per vias naturales.

=====

A) Einleitung.

Es ist schon sehr viel über die Frage gearbeitet worden, inwieweit nach vorausgegangenen Kaiserschnitten noch Spontangeburt möglich sind; ob es sich lohnt, in solchen Fällen auf die Spontanentbindung zu warten, wann und in welchen Fällen.

(Naujoks, Pauwens, Winter u.v.a.m.)

Die entgegengesetzte Frage, nämlich, wann und wie oft und aus welcher Indikation nach bereits vorausgegangenen Spontangeburt Kaiserschnitte notwendig wurden, ist wohl noch nicht bearbeitet worden, da wir in der Literatur keine Analyse der Relation Sectio nach Spontangeburt gefunden haben.

Dieses Thema soll nun an Hand des Materials aus der Würzburger Universitäts-Frauen-Klinik über einen Zeitraum von 28 Jahren (1925-1953) in der nachfolgenden Arbeit behandelt werden.

B) Arbeitsmethode.

Den eigenen Untersuchungen liegt das Material der Würzburger Universitäts-Frauenklinik über einen Zeitraum von 28 Jahren (1925-1952) zugrunde. In dieser Zeit haben insgesamt 32038 Geburten stattgefunden, von denen in 282 Fällen eine Schnittentbindung vorgenommen worden ist, obwohl bei diesen Frauen schon eine oder mehrere Geburten per vias naturales vorausgegangen waren; das sind 0,88 % aller Geburten.

Bei der Zusammenstellung der Fälle wurden folgende Daten berücksichtigt:

1. Alter der Patientin bei der Sectio,
2. Art der vorangegangenen Geburten,
3. Dauer aller Graviditäten,
4. Geburtsgewicht, Größe und Kopfumfang des Kindes,
5. Beckenmaße der Mutter,
6. Die Indikationen zur Sectio nach vaginaler Geburt,
7. Postoperativer Verlauf für Mutter und Kind.

## Zeichen - Erklärungen:

=====

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Lfd.Nr.  | = Laufende Nummer              |
| Krbl.Nr. | = Krankenblatt-Nummer          |
| ?        | = entsprechende Angaben fehlen |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <u>Geburtsart:</u> | o = spontane Geburt |
|                    | Z = Zangengeburt    |
|                    | A = Abort           |
|                    | F = Frühgeburt      |
|                    | S = Sectio          |
|                    | Perf. = Perforation |
|                    | + = totes Kind      |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <u>Graviditätsdauer:</u> | re = rechtzeitig entbunden |
|                          | at = ante terminum         |
|                          | pt = post terminum         |
|                          | 9 = 9 Tage                 |
|                          | V = Mens V                 |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <u>Kindliches Gewicht</u> | in Gramm                  |
| Größe                     | in Centimetern            |
| Kopfumfang                | in Centimetern            |
| Beckenmaße                | in Centimetern            |
| sp                        | = Distantia spinarum      |
| c                         | = Distantia cristarum     |
| t                         | = Distantia trochanterica |
| ex                        | = Conjugata externa       |
| vera                      | = Conjugata vera          |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <u>Indikation:</u> | EB = enges Becken     |
| MiBv.              | = Mißverhältnis       |
| Pl.pr.             | = Placenta praevia    |
| centr.             | = centralis           |
| lat.               | = lateralis           |
| marg.              | = marginalis          |
| ausw.              | = Entbindung auswärts |

# Zusammenstellung der Sectio-Fälle nach den verschiedenen Indikationsgruppen

## I. Fälle mit einmaliger Sectio

| Lfd. Nr. | Krbl.Nr.  | Name | Alter    | Geburts-<br>Jahr             | Art              | Grav.<br>dauer           | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera      | Indikation<br>zur Sectio                                                                      |
|----------|-----------|------|----------|------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 104/1949  | R.M. | 26       | 1946<br>1949                 | o<br>s           | re<br>re                 | 2800<br>3180 52/35                            | 24/27,5/<br>30/20                          | EB I. o<br>Mißverhältnis                                                                      |
| 2        | 292/1940  | H.M. | 37       | 1936<br>1940                 | o<br>s           | re<br>9at                | 3770<br>3960 56/36                            | 26/28,5/<br>30/18,5/<br>2,5                | EB I. o<br>Mißverhältnis; Kopf tritt<br>nicht tiefer                                          |
| 3        | 532/1932  | K.E. | 32       | 1930<br>1932                 | Z+<br>s          | re<br>8pt                | ?<br>53/<br>34,5 53/34                        | 26/28,5/<br>29,5/17/<br>9                  | EB I. o<br>Allg. verengtes Becken;<br>relatives Mißverhältnis;<br>Geburtsstillstand           |
| 4        | 55/1932   | M.E. | 27<br>29 | 1930<br>1932                 | o+<br>s          | re<br>M.X                | 5000<br>3150 53/37                            | 25/27/29/<br>17,5/9,5                      | EB I. o<br>Allg. schräg verengtes<br>Becken. Mißverhältnis                                    |
| 5        | 1296/1950 | B.A. | 41       | 1942<br>1947<br>1950         | Z++<br>A<br>s    | re<br>M.IV<br>re         | ?<br>/                                        | 29/31/32/<br>18/<br>53/37                  | EB I. o<br>1942: Gemini ++<br>1950: Mißverhältnis; abge-<br>wichene Schädelanlage             |
| 6        | 1283/1950 | M.M. | 35       | 1940<br>1950                 | o<br>s           | re<br>lopt               | 3250<br>3660 52/37                            | 24/27/29/<br>18/<br>10,5                   | EB I. o<br>Rachitischer Zwergwuchs;<br>Mißverhältnis; primäre<br>Wehenschwäche                |
| 7        | 368/1949  | L.A. | 45       | 1930<br>1942<br>1946<br>1949 | o<br>A<br>A<br>s | re<br>M.?<br>M.?<br>13pt | 3150<br>/                                     | 24,5/26/<br>30/18,5/<br>10,5<br>4500 55/38 | EB I. o<br>Querlage; Hydramnion; früh-<br>zeitiger Blasensprung.<br>Functionell alte II. para |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Grav.<br>Art | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/o/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                                                | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|----------|------|-------|------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 8       | 600/1944 | W.E. |       | 1929 o           | re           | 3200                                          | 25/28/31/<br>18,5/10,6                | EB I.o<br>Querlage; Kopflage<br>wird eingestellt,<br>läßt sich nicht<br>halten. Blutung;<br>Muttermund ge-<br>schlossen |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1931 o           | re           | 3600                                          |                                       |                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1933 ope?+       | re           | 4500                                          |                                       |                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1934 o           | re           | 3000                                          |                                       |                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1935 ope?+       | ?            | /                                             |                                       |                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1936 ope?        | 28pt         | 2700                                          |                                       |                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1938 ope?        | re           | 3000                                          |                                       |                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1939 ope?+       | ?            | /                                             |                                       |                                                                                                                         |                                  |                                  |
| 39      |          |      |       | 1944 S           | 14at         | 2870                                          | 50/34                                 |                                                                                                                         |                                  |                                  |
| 9       | 69/1943  | K.M. |       | 1936 o           | re           | 3750                                          | 24,5/27,5<br>31/19/                   | EB I.o<br>Querlage; frühzei-<br>tiger Blasensprung;<br>doppeltes Promuntu-<br>rium                                      |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1943 S           | 6pt          | 3620                                          | 54/37                                 |                                                                                                                         |                                  |                                  |
| 40      |          |      |       | 1925 o           | re           | 2500                                          | 26/28/30/<br>19/                      | EB I.o<br>Abgewichener Kopf;<br>stellt sich trotz<br>Lagerung nicht ein.<br>Geburtsstillstand                           |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1927 A           | M.II         | /                                             |                                       |                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1941 S           | re           | 4120                                          | 52/36                                 |                                                                                                                         |                                  |                                  |
| 11      | 251/1940 | P.A. |       | 1931 o           | re           | 3250                                          | 26/27,5/<br>29/19,5/<br>9,3           | EB I.o<br>Litzmann'-Obliquität;<br>durch Lagerung nicht<br>zu beseitigen                                                |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1932 A           | M.?          | /                                             |                                       |                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1935 F           | M.?          | 1500                                          |                                       |                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1940 S           | 18pt         | 3340                                          | 56/36                                 |                                                                                                                         |                                  |                                  |
| 39      |          |      |       | 1930 o           | re           | 4000                                          | 26,5/29,5<br>30/19/9,5                | EB I.o<br>Litzmann'-Obliquität                                                                                          |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1935 o           | re           | 3000                                          |                                       |                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1940 S           | M.X          | 3550                                          | 54/36                                 |                                                                                                                         |                                  |                                  |
| 31      |          |      |       | 1936 F+          | M.VIII       | 1500                                          | 25,5/27/<br>30/19,5<br>10,1           | EB I.o<br>Placenta praevia lat.<br>Schwankende Herzöne;<br>Blutung                                                      |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1938 o           | re           | 3000                                          |                                       |                                                                                                                         |                                  |                                  |
| 29      |          |      |       | 1940 S           | 10at         | 2800                                          | 50,5/<br>35,5                         |                                                                                                                         |                                  |                                  |
| 12      | 201/1940 | H.M. |       | 1933 o+          | re           | 3800                                          | 27/29/32/<br>19/9                     | EB I.o<br>Litzmann'-Obliquität.<br>Schwankende Herzöne.                                                                 |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1934 o           | re           | 3000                                          |                                       |                                                                                                                         |                                  |                                  |
| 13      | 115/1940 | S.H. |       | 1938 S           | 8pt          | 4350                                          | 58/33                                 |                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1940 S           |              |                                               |                                       |                                                                                                                         |                                  |                                  |
| 40      |          |      |       | 1933 o+          | re           | 3800                                          | 27/29/32/<br>19/9                     | EB I.o<br>Litzmann'-Obliquität.<br>Schwankende Herzöne.                                                                 |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1934 o           | re           | 3000                                          |                                       |                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1938 S           |              |                                               |                                       |                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1940 S           |              |                                               |                                       |                                                                                                                         |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr. | Name  | Alter | Geburts-<br>Jahr             | Art                   | Grav. | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang           | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                                   | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|----------|-------|-------|------------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 15      | 901/1935 | W.M.  | 31    | 1933<br>1935                 | o+<br>S               |       | re 4000<br>M.Ä 3450<br>54/<br>37,5                      | 26/27/31/<br>19/9,9                   | EB I.0<br>Absinken der Herz-<br>töne; starke Kon-<br>figuration des<br>Kopfes                              | Peritonitis                      |                                  |
| 16      | 859/1935 | K.B.  | 28    | 1931<br>1935                 | Z<br>S                |       | re 3000<br>re 3480<br>51/35                             | 24/26/28/<br>18/9,7                   | EB I.0<br>Allg.verengtes<br>Becken; schlechte<br>Herztöne                                                  |                                  |                                  |
| 17      | 496/1934 | E.Ch. | 34    | 1929<br>1930<br>1934         | o+<br>o<br>S          |       | re ?<br>re 3350<br>15pt 3550<br>54/40                   | 26/28/31/<br>18,5/9,4                 | EB I.0<br>Mißverhältnis;<br>großer Kopf; ab-<br>sinkende Herztöne                                          | Peritonitis                      |                                  |
| 18      | 261/1934 | G.I.  |       | 1923<br>1931<br>1933         | o<br>o<br>A           |       | re 4000<br>re 4250<br>M.III --                          | 26/28/30/<br>19,5/9,4                 | EB I.0<br>Placenta praevia;<br>Absinkende Herz-<br>töne                                                    |                                  |                                  |
| 19      | 182/1933 | G.V.  | 29    | 1934<br>1930<br>1932<br>1933 | S<br>o+<br>o<br>S     |       | M.IX 2230<br>46/32<br>re ?<br>re ?<br>8at 2950<br>51/35 | 26/29/33/<br>19,5/9,1                 | EB I.0<br>Leichte Nephro-<br>pathia grav. 2 fru-<br>stane Geburten                                         |                                  |                                  |
| 20      | 161/1933 | R.L.  | 35    | 1930<br>1933                 | o<br>S                |       | re ?<br>7pt 3750<br>56/37                               | 27,5/31/<br>37/22,9                   | EB I.0<br>Nephropathia gra-<br>vidarum; Nabel-<br>schnurvorfal                                             |                                  |                                  |
| 21      | 666/1932 | F.M.  | 39    | 1922<br>1923<br>1926<br>1932 | o+<br>o<br>Perf.<br>S |       | re 2250<br>re 2500<br>re 5000<br>re 4100<br>55/37       | 26,5/29/<br>33/22,5/<br>9,7           | EB I.0<br>Nephropathia grav.<br>Praeeklampsie;<br>frühzeitiger Bla-<br>sensprung; 3 fru-<br>stane Geburten |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav.     | Kind<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                                                                                                                             | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter                                    | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|----------|------|-------|------------------|-----|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 22      | 418/1932 | E.A. |       | 1919             | o   | re ?      |                                   | 26/29/<br>31,5/19/<br>9,7             | EB I. o<br>Eklampsie sub<br>partu; Auftreten<br>einer Ruptur;<br>frühzeitiger Bla-<br>sensprung; Foetus<br>mortuus                                                                                   | Uterusrup-<br>tur bei<br>Eklampsie<br>(Obdukt.-<br>befund<br>fehlt) |                                  |
| 23      | 224/1932 | G.M. |       | 1924             | o+  | re 4500   |                                   | 25,5/28,5<br>34/20/9,2                | EB I. o<br>2 frustane<br>Geburten                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                  |
| 24      | 292/1931 | I.M. | 32    | 1932             | s   | 10pt 3500 | 53/37                             |                                       | EB I. o<br>Status nach zwei<br>Totgeburten                                                                                                                                                           |                                                                     |                                  |
| 25      | 648/1930 | R.W. | 38    | 1931             | s   | M.X 4000  | 53/38                             | 23/29,5/<br>32,5/20/<br>9,8           | EB I. o<br>Naegeler'-Obliqui-<br>tät; Dermoidcyste<br>am re Ovar, als Ge-<br>burtshindernis.<br>Cyste an der Rück-<br>fläche des Uterus<br>im Douglas fixiert,<br>stand in Verbindung<br>mit re Ovar |                                                                     |                                  |
| 26      | 545/1925 | L.H. | 29    | 1925             | z   | re 3850   |                                   | 26,5/29<br>31/18/9,8                  | EB I. o<br>Platttrachitisches<br>Becken. Querlage                                                                                                                                                    |                                                                     |                                  |
| 27      | 104/1945 | K.F. | 34    | 1925             | s   | 14pt 3000 | 51/34,5                           | 26/27/<br>31,5/17,5<br>8,7            | EB I. o<br>Vorliegende Nabel-<br>schnur; beschleunig-<br>te Herzträge                                                                                                                                |                                                                     |                                  |
| 28      |          |      |       | 1937             | o+  | re 4500   |                                   | 27/28,5/<br>31/19/9,4                 | EB I. o                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                  |
| 29      |          |      |       | 1939             | o   | re 3740   |                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                  |
| 30      |          |      |       | 1942             | z+  | re 4350   |                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                  |
| 31      |          |      |       | 1945             | s   | re 4130   | 55/36,5                           |                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                  |

| Lfd. Nr. | Krbl. Nr. | Name  | Alter | Geburts-<br>Jahr             | Art                    | Grav. Kind<br>dauer                      | Kopf-<br>Größe/<br>Gewicht/<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                                   | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|----------|-----------|-------|-------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 15       | 901/1935  | W.M.  | 31    | 1933<br>1935                 | o+<br>S                | re 4000<br>M.I 3450                      | 54/<br>37,5                           | 26/27/31/<br>19/9,9                   | EB I.o<br>Absinken ver Herz-<br>töne; starke Kon-<br>figuration des<br>Kopfes                              | Peritonitis                      |                                  |
| 16       | 859/1935  | K.B.  | 28    | 1931<br>1935                 | Z<br>S                 | re 3000<br>re 3480                       | 51/35                                 | 24/26/28/<br>18/9,7                   | EB I.o<br>Allg.verengtes<br>Becken; schlechte<br>Herztöne                                                  |                                  |                                  |
| 17       | 496/1934  | E.Ch. | 34    | 1929<br>1930<br>1934         | o+<br>o<br>S           | re ?<br>re 3350<br>15pt 3550             | 54/40                                 | 26/28/31/<br>18,5/9,4                 | EB I.o<br>Mißverhältnis;<br>großer Kopf; ab-<br>sinkende Herztöne                                          | Peritonitis                      |                                  |
| 18       | 261/1934  | G.I.  |       | 1923<br>1931<br>1933         | o<br>o<br>A            | re 4000<br>re 4250<br>M.III --           |                                       | 26/28/30/<br>19,5/9,4                 | EB I.o<br>Placenta praevia;<br>Absinkende Herz-<br>töne                                                    |                                  |                                  |
| 19       | 182/1933  | G.V.  | 35    | 1934<br>1930<br>1932<br>1933 | S<br>o+<br>o+<br>S     | M.IX 2230<br>re ?<br>re ?<br>8at 2950    | 46/32                                 | 26/29/33/<br>19,5/9,1                 | EB I.o<br>Leichte Nephropa-<br>thia grav. 2 fru-<br>stirane Geburten                                       |                                  |                                  |
| 20       | 161/1933  | R.L.  | 35    | 1930<br>1933                 | o<br>S                 | re ?<br>7pt 3750                         | 56/37                                 | 27,5/31/<br>37/22/9                   | EB I.o<br>Nephropathia gra-<br>vidarum; Nabel-<br>schnurvorfall                                            |                                  |                                  |
| 21       | 666/1932  | F.M.  | 39    | 1922<br>1923<br>1926<br>1932 | o+<br>o+<br>Perf.<br>S | re 2250<br>re 2500<br>re 5000<br>re 4100 | 55/37                                 | 26,5/29/<br>33/22,5/<br>9,7           | EB I.o<br>Nephropathia grav.<br>Praeeklampsie;<br>frühzeitiger Bla-<br>sensprung; 3 fru-<br>stane Geburten |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav.   | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                                                                                                                            | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter                                    | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|----------|------|-------|------------------|-----|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 22      | 418/1932 | E.A. |       | 1919             | o   | re ?    |                                               | 26/29/<br>31,5/19/<br>9,7             | EB I. o<br>Eklampsie sub<br>partu; Auftreten<br>einer Ruptur;<br>frühzeitiger Bla-<br>sensprung; Foetus<br>mortuus                                                                                  | Uterusrup-<br>tur bei<br>Eklampsie<br>(Obdukt.-<br>befund<br>fehlt) |                                  |
| 23      | 224/1932 | G.M. |       | 1924             | o+  | re 4500 |                                               | 25,5/28,5<br>34/20/9,2                | EB I. o<br>2 frustane<br>Geburten                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                  |
| 24      | 292/1931 | I.M. | 32    | 1929             | o+  | re 3400 |                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                  |
| 25      | 648/1930 | R.W. | 38    | 1925             | z   | re 3850 |                                               | 23/29,5/<br>32,5/20/<br>9,8           | EB I. o<br>Status nach zwei<br>Totgeburten                                                                                                                                                          |                                                                     |                                  |
| 26      | 545/1925 | L.H. |       | 1927             | o   | re ?    |                                               | 26,5/29<br>31/18/9,8                  | EB I. o<br>Naegeli'-Obliqui-<br>tät; Dermoidcyste<br>am re Ovar, als Ge-<br>burtshindernis.<br>Cyste an der Rück-<br>fläche des Uterus<br>im Douglas fixiert,<br>stand in Verbindung<br>mit re Ovar |                                                                     |                                  |
| 27      | 104/1945 | K.F. | 34    | 1925             | s   | re 4500 |                                               | 26/27/<br>31,5/17,5<br>8,7            | EB I. o<br>Platttrachtisches<br>Becken. Querlage                                                                                                                                                    |                                                                     |                                  |
|         |          |      | 30    | 1942             | z+  | re 4350 |                                               | 27/28,5/<br>31/19/9,4                 | EB I. o<br>Vorliegende Nabel-<br>schnur; beschleunig-<br>te Herztöne                                                                                                                                |                                                                     |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr.  | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr                       | Art | Grav.                               | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                                   | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|-----------|------|-------|----------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 28      | 384/1944  | E.H. | 45    | 1931 c<br>1944 S                       |     |                                     | re 3125<br>5pt 2720                           | 24/27/30/<br>18/9,3                   | EB I.o<br>Leichte Litzmann'-<br>Obliquität; primäre<br>Wehenschwäche; Mul-<br>tiple sclerose der<br>Mutter |                                  |                                  |
| 29      | 218/1944  | K.M. |       | 1937 o<br>1939 o+<br>1941 o+<br>1944 S |     |                                     | re 3000<br>re 4000<br>re 3500<br>14pt 2910    | 28/31/34/<br>22/<br>51/35             | EB I.o<br>Vorzeitiger Blasen-<br>sprung; Ansteigende<br>Herztöne; Status<br>nach 2 toten Kin-<br>dern      |                                  |                                  |
| 30      | 312/1943  | R.B. |       | 1939 A<br>1942 o+<br>1943 S            |     | M.II<br>re 2150<br>15pt 3400        | --<br>2150<br>3400                            | 27/28/28/<br>17/9,7                   | EB I.o<br>Litzmann'-Obliqui-<br>tät; Vitium cordis<br>der Mutter                                           | Komb. Mitralvitium<br>Lungenödem |                                  |
| 31      | 66/1939   | S.A. |       | 1932 A<br>1935 Z<br>1939 S             |     | M.?<br>21pt 4250<br>14pt 3770       | --<br>4250<br>3770                            | 28/31/33/<br>19/<br>55/35             | EB I.o<br>Nabelschnurvorfall;<br>Meconiumabgang                                                            |                                  |                                  |
| 32      | 55/1934   | M.D. |       | 1912 o<br>1928 Z<br>1934 S             |     | re 3750<br>re 5500<br>re 3750       | 3750<br>5500<br>3750                          | 32/35/37/<br>24/9,1<br>54/35          | EB I.o<br>Praeeklampsie;<br>Adipositas                                                                     | Peritonitis                      |                                  |
| 33      | 25/1932   | H.M. |       | 1925 A<br>1925 F+<br>1929 o<br>1932 S  |     | M.III<br>M. ?<br>re 3250<br>re 3850 | --<br>?<br>3250<br>3850                       | 26/29/33/<br>21/9,4<br>52/36,5        | EB I.o<br>Hohe Herztöne                                                                                    |                                  |                                  |
| 34      | 1214/1952 | D.H. | 36    | 1940 Z<br>1952 S                       |     | re 3000<br>12pt 3300                | 3000<br>3300                                  | 25/26/28/<br>17,5/<br>53/34           | EB II.o<br>Platrachitisches<br>Becken                                                                      |                                  |                                  |
| 35      | 350/1942  | M.A. | 27    | 1941 Z<br>1942 S                       |     | re 4000<br>re 3850                  | 4000<br>3850                                  | 25/27/30/<br>18,5/8,6<br>52/35        | EB II.o<br>Vorzeitiger Blasen-<br>sprung                                                                   |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr.  | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr                                             | Art                                          | Grav.                                           | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang           | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                                 | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter                                                     | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|-----------|------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 36      | 1060/1950 | S.I. | 30    | 1949<br>1950                                                 | 0<br>S                                       | re<br>re                                        | 3000<br>3690                                            | 27/29/31/<br>17,5                     | EB II. <sup>0</sup><br>Platttrachitisches<br>Becken; starkes<br>Mißverhältnis                            |                                                                                      |                                  |
| 37      | 1959/1948 | M.R. |       | 1933<br>1934<br>1935<br>1937<br>1945<br>1947<br>1948         | 0<br>A<br>0<br>0<br>A<br>A<br>S              | re<br>M.III<br>re<br>re<br>M.III<br>M.III<br>re | 3750<br>--<br>3980<br>3400<br>--<br>--<br>3940          | 25/27/32/<br>19/8,9                   | EB II. <sup>0</sup><br>Elongatio colli;<br>starke Varicositas<br>vulvae et vaginae.<br>Mißverhältnis     |                                                                                      |                                  |
| 38      | 450/1948  | T.J. | 34    | 1946<br>1948                                                 | Z<br>S+                                      | re<br>re                                        | 3500<br>3300                                            | 21,5/25/<br>28/18                     | EB II. <sup>0</sup> Mißv.<br>Verzögerter Blasen-<br>sprung                                               | Struma cong.<br>Stenose der<br>Trachea Atelekt.<br>der Lunge, Zeich.<br>der Asphyxie |                                  |
| 39      | 544/1946  | L.W. | 30    | 1941<br>1946                                                 | 0+<br>S                                      | 3pt<br>5pt                                      | 3000<br>3030                                            | 24/25,5/<br>29/17                     | EB II. <sup>0</sup>                                                                                      |                                                                                      |                                  |
| 40      | 640/1941  | B.L. |       | 1931<br>1940<br>1941                                         | 0<br>0+<br>S                                 | pt<br>pt<br>15pt                                | 3250<br>3500<br>3100                                    | 26/30/<br>33,5/18,5<br>8,9            | EB II. <sup>0</sup>                                                                                      |                                                                                      |                                  |
| 41      | 152/1939  | R.M. |       | 1924<br>1925<br>1930<br>1933<br>1935<br>1936<br>1938<br>1939 | Z<br>Z<br>Z<br>A<br>0<br>Perf.<br>Perf.<br>S | re<br>re<br>re<br>M.V<br>re<br>re<br>re<br>10at | ?<br>4000<br>4000<br>--<br>4000<br>3650<br>3770<br>3520 | 24/26,5/<br>31/18/8,2                 | EB II. <sup>0</sup><br>Da 2x Perforation<br>wegen engen Beckens,<br>wurde jetzt die<br>Sectio ausgeführt |                                                                                      |                                  |
|         |           |      | 41    | 1939                                                         | S                                            |                                                 | 51/36                                                   |                                       |                                                                                                          |                                                                                      |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav. Kind<br>dauer | Kopf-<br>Größe/<br>Gewicht/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                   | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter des Kindes |
|---------|----------|------|-------|------------------|-----|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 42      | 848/1937 | S.E. |       | 1934 Z           |     | re ?                | umfang                                         | 25/27/32/<br>19/7,8                   | EB II.°<br>Mißverhältnis                                                                   |                                             |
|         |          |      | 27    | 1935 Z           |     | re ?                |                                                |                                       |                                                                                            |                                             |
|         |          |      |       | 1937 S           |     | re 4180             | 54/38                                          |                                       |                                                                                            |                                             |
| 43      | 836/1937 | Z.K. |       | 1923 o           |     | 19at 3000           |                                                | 25/27/<br>29,5/18,5<br>7,9            | EB II.°<br>Mißverhältnis                                                                   |                                             |
|         |          |      |       | 1926 o           |     | re 2700             |                                                |                                       |                                                                                            |                                             |
|         |          |      |       | 1927 o           |     | re 2750             |                                                |                                       |                                                                                            |                                             |
|         |          |      |       | 1932 Perf.       |     | re 3000             |                                                |                                       |                                                                                            |                                             |
|         |          |      | 41    | 1937 S           |     | 7pt 3640            | 53/35                                          |                                       |                                                                                            |                                             |
| 44      | 385/1935 | B.M. |       | 1923 o           |     | ? ?                 |                                                | 27/28/31/<br>19,5/8,3                 | EB II.°<br>Status nach Perfo-<br>ration und Übertra-<br>gung; frühzeitiger<br>Blasensprung |                                             |
|         |          |      |       | 1925 o           |     | ? ?                 |                                                |                                       |                                                                                            |                                             |
|         |          |      |       | 1929 o           |     | ? ?                 |                                                |                                       |                                                                                            |                                             |
|         |          |      |       | 1930 o           |     | ? ?                 |                                                |                                       |                                                                                            |                                             |
|         |          |      |       | 1932 o           |     | ? ?                 |                                                |                                       |                                                                                            |                                             |
|         |          |      |       | 1934 Perf.       |     | 28pt ?              |                                                |                                       |                                                                                            |                                             |
|         |          |      | 32    | 1935 S           |     | 14pt 3850           | 54/36                                          |                                       |                                                                                            |                                             |
| 45      | 476/1932 | W.A. | 31    | 1931 o+          |     | re ?                |                                                | 24,5/27,5/<br>32/19,5<br>3,5          | EB II.°<br>Vorzeitiger Blasen-<br>sprung; Status nach<br>Totgeburt                         |                                             |
|         |          |      |       | 1932 S           |     | 4at 3900            |                                                |                                       |                                                                                            |                                             |
| 46      | 34/1930  | S.R. |       | 1914 o           |     | re ?                |                                                | 23,5/25,5<br>29/17/8,8                | EB II.°<br>Platrachitisches<br>Becken                                                      |                                             |
|         |          |      | 38    | 1920 o+          |     | 14at 2200           |                                                |                                       |                                                                                            |                                             |
|         |          |      |       | 1930 S           |     | re 2700             | 52/35                                          |                                       |                                                                                            |                                             |
| 47      | 310/1928 | S.D. |       | 1924 o+          |     | re ?                |                                                | 22/25,5/<br>7/17/7,8                  | EB II.°<br>1925: Gemini<br>Platrachitisches<br>Becken; Vorzeitiger<br>Blasensprung.        |                                             |
|         |          |      | 32    | 1925 o           |     | re 2680             |                                                |                                       |                                                                                            |                                             |
|         |          |      |       | 1925 o           |     | re 3100             |                                                |                                       |                                                                                            |                                             |
|         |          |      |       | 1928 S           |     | 28pt 3850           | 56/36                                          |                                       |                                                                                            |                                             |
| 48      | 100/1929 | W.J. |       | 1920 A           |     | M.?                 |                                                | 27/29/32/<br>20/7,75                  | EB II.°<br>Allg. verengtes<br>plattes Becken                                               |                                             |
|         |          |      |       | 1921 o+          |     | re 5000             |                                                |                                       |                                                                                            |                                             |
|         |          |      |       | 1924 o           |     | re 3300             |                                                |                                       |                                                                                            |                                             |
|         |          |      | 36    | 1929 S           |     | 10pt 3200           | 52/44,5                                        |                                       |                                                                                            |                                             |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr.  | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art  | Grav. Kind<br>dauer | Kopf-<br>Gewicht/<br>Größe/<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera                                        | Indikation<br>zur Sectio                                                                                                                                                                                                                                                 | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|-----------|------|-------|------------------|------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 49      | 1315/1950 | W.B. |       | 1937 o           |      | re 3170             | 28/30/32/<br>20/8                     | EB II.°                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1938 o           |      | 14at 3000           |                                       |                                                                              | Litzmann'-Obliqui-<br>tät; Mißverhältnis,<br>großes Kind                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1939 o           |      | re 3000             |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1941 o+          |      | re 3000             |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1942 o+          |      | re 3500             |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1943 o           |      | re 3000             |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1947 o+          |      | re ?                |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
| 39      |           |      |       | 1950 s           |      | re 3850             | 54/36,5                               |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
| 50      | 597/1949  | K.R. |       | 1930 z           |      | re 4000             | 25,5/27/<br>31/18/8,4                 | EB II.°                                                                      | Primäre Wehenschwäche;<br>kaum zu beeinflussen;<br>Blasensprung vor 36<br>Stunden; keine Aus-<br>sicht per vias natu-<br>rales ein lebendes<br>Kind zu erhalten. Mut-<br>termund noch für 3<br>Querfinger durchgängig;<br>Fruchtwasser mekonium-<br>haltig, übelriechend |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1932 o           |      | re 3500             |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1933 o           |      | re 3400             |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1935 o           |      | re ?                |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1937 o           |      | re ?                |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1938 Perf.       |      | re ?                |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1940 o           | 21pt | ?                   | 56/37                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
| 45      |           |      |       | 1949 s           |      | ?                   |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
| 51      | 471/1949  | B.S. |       | 1947 o           |      | re 3250             | 25,5/28,5                             | EB II.°                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
|         |           |      | 24    | 1949 s           |      | re 3520             | 52/34                                 | Höher Gradstand                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
| 52      | 101/1945  | S.E. |       | 1932 z           |      | re 2250             | 27/30/<br>33,5/20,5                   | EB II.°                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
|         |           |      | 35    | 1945 s           |      | 14pt 3600           | 53/?<br>8,2                           | Steigende Herztöne                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
| 53      | 856/1944  | M.B. |       | 1941 z           |      | re 2650             | 24,5/27/<br>30/18,5/<br>8,8           | EB II.°                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
|         |           |      | 25    | 1944 s           |      | re 3570             | 51/33                                 | Mißverhältnis                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
| 54      | 122/1944  | K.P. |       | 1939 z           |      | re 3100             | 27,5/30,5<br>33/19/8,4                | EB II.°                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1940 Perf.       |      | re 3000             |                                       | Uterus arcuatus; Quer-<br>lage; Vergeblicher<br>äußerer Wendungsver-<br>such |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
|         |           |      | 32    | 1944 s           |      | re 3350             | 53/33                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr.  | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav. Kind<br>dauer | Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                                  | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|-----------|------|-------|------------------|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 55      | 486/1942  | S.F. |       | 1931             | o   | re 1750             |                                       | 26/29/32/<br>18,5/7,8                 | EB II.°<br>Übertragung;<br>großes Kind                                                                    |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1935             | Z   | re 3750             |                                       |                                       |                                                                                                           |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1937             | o   | re 3110             |                                       |                                       |                                                                                                           |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1938             | Z   | re 3190             |                                       |                                       |                                                                                                           |                                  |                                  |
|         |           |      | 36    | 1942             | S   | 21pt 3750           | 52/37                                 |                                       |                                                                                                           |                                  |                                  |
| 56      | 30/1942   | F.A. | 37    | 1932             | Z   | re 5500             |                                       | 27/20,5/<br>29,5/19/                  | EB II.°<br>Descensus vaginalis;<br>Wehenschwäche;<br>schlechte Herztöne;<br>vorzeitiger Blasen-<br>sprung |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1942             | S   | re 3500             | 52/36                                 |                                       |                                                                                                           |                                  |                                  |
| 57      | 542/1942  | B.M. |       | 1935             | o   | re 3000             |                                       | 23/26,5/<br>28,5/19,5                 | EB II.°<br>Vorzeitiger Blasen-<br>sprung; hoher Grad-<br>stand; Mißverhältnis                             |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1936             | o   | re 3300             |                                       | 8,9                                   |                                                                                                           |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1939             | o   | re 2140             |                                       |                                       |                                                                                                           |                                  |                                  |
|         |           |      | 38    | 1942             | S   | 10at 3770           | 54/37                                 |                                       |                                                                                                           |                                  |                                  |
| 58      | 308/1941  | O.B. |       | 1933             | o+  | re ?                |                                       | 24,5/27,5<br>31/18/8,4                | EB II.°<br>Absinkende Herztöne                                                                            |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1935             | o   | re 3250             |                                       |                                       |                                                                                                           |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1939             | A   | M.III --            |                                       |                                       |                                                                                                           |                                  |                                  |
|         |           |      | 37    | 1941             | S   | 8pt 2640            | 49/37                                 |                                       |                                                                                                           |                                  |                                  |
| 59      | 82/1941   | R.L. |       | 1930             | Z+  | re 3000             |                                       | 28/31/32/<br>19,5/8,4                 | EB II.°<br>Schwankende und ab-<br>sinkende Herztöne                                                       |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1931             | Z   | re 3000             |                                       |                                       |                                                                                                           |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1933             | o   | re 2900             |                                       |                                       |                                                                                                           |                                  |                                  |
|         |           |      | 32    | 1936             | S   | re 3010             | 51/?                                  |                                       |                                                                                                           |                                  |                                  |
| 60      | 1129/1940 | W.M. |       | 1935             | Z+  | re ?                |                                       | 27/29/32/<br>20/8                     | EB II.°<br>Litzmann'-Obliquität.<br>Status nach 3 toten<br>Kindern                                        |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1937             | o+  | re ?                |                                       |                                       |                                                                                                           |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1938             | o+  | re 3830             |                                       |                                       |                                                                                                           |                                  |                                  |
|         |           |      | 35    | 1940             | S   | 20pt 3560           | 52,5/35                               |                                       |                                                                                                           |                                  |                                  |
| 61      | 634/1940  | S.M. |       | 1934             | Z+  | re 3000             |                                       | 24/27/30<br>17,5/6,6                  | EB II.°<br>Querlage; Hydrämion                                                                            |                                  |                                  |
|         |           |      | 36    | 1940             | S   | 11pt 3480           | 52/35                                 |                                       |                                                                                                           |                                  |                                  |
| 62      | 365/1940  | W.R. |       | 1929             | o   | re 4750             |                                       | 25/28/31/<br>19/                      | EB II.°<br>Abweichende Herztöne;<br>Wehenschwäche; Kopf<br>tritt nicht tiefer                             |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1931             | o   | re 3750             |                                       |                                       |                                                                                                           |                                  |                                  |
|         |           |      | 25    | 1940             | S   | 7pt 3210            | 54/37,5                               |                                       |                                                                                                           |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr.  | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr                                             | Art                                    | Grav.                                          | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang    | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                      | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|-----------|------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 63      | 120/1940  | W.B. | 29    | 1936<br>1937<br>1940                                         | o+<br>A<br>S                           | re<br>M.II<br>9pt                              | 3300<br>---<br>3780                              | 24/27/32/<br>20/8,6<br>53/39,5        | EB II.o<br>Steiß-Fußlage; vor-<br>zeitiger Blasen-<br>sprung                  |                                  |                                  |
| 64      | 1494/1939 | B.F. |       | 1935<br>1937<br>1939                                         | Z<br>o<br>S                            | re<br>re<br>re                                 | ?<br>2500<br>2820                                | 23,5/25/<br>27,5/17,5<br>50/34 8,9    | EB II.o<br>Querlage                                                           |                                  |                                  |
| 65      | 358/1938  | E.B. | 37    | 1937<br>1938                                                 | o+<br>S                                | re<br>9pt                                      | ?<br>3590                                        | 29/31/33/<br>7/9,5                    | EB II.o<br>Großes Kind; hohes<br>Alter der Patientin                          |                                  |                                  |
| 66      | 747/1937  | K.F. | 28    | 1935<br>1936<br>1937                                         | Z+<br>o+<br>S                          | re<br>re<br>9pt                                | 4000<br>?<br>3520                                | 25,5/27/<br>30/18,5/<br>54/35 8,7     | EB II.o<br>Litzmann'-Obliqui-<br>tät; Exostose am<br>re ileosacral-<br>gelenk | Peritonitis,<br>Ileus            |                                  |
| 67      | 918/1936  | G.M. | 34    | 1934<br>1936                                                 | Z<br>S                                 | re<br>7pt                                      | 3250<br>3240                                     | 24/25/<br>28,5/17,5<br>8,8            | EB II.o<br>Litzmann'-Obliqui-<br>tät                                          |                                  |                                  |
| 68      | 795/1936  | W.M. |       | 1923<br>1926<br>1928<br>1929<br>1930<br>1932<br>1933<br>1935 | o+<br>o<br>F<br>o<br>o<br>o+<br>o<br>o | re<br>re<br>M.VIII<br>re<br>re<br>re<br>?<br>? | 4000<br>4000<br>?<br>4750<br>3400<br>?<br>?<br>? | 24,5/29/<br>31/16,5/<br>8,1           | EB II.o<br>Naegelle'-Obliqui-<br>tät; Uterusrupturn;<br>Mibv.                 | Obduktions-<br>befund fehlt      |                                  |
| 69      | 531/1936  | S.A. | 27    | 1936<br>1936                                                 | S+<br>o<br>S                           | 8pt<br>re<br>10at                              | 3080<br>3000<br>3150                             | 51/38<br>22/23,5/<br>26,5/17/<br>8,9  | EB II.o<br>Litzmann'-Obliqui-<br>tät                                          |                                  |                                  |
| 70      | 609/1935  | W.K. | 26    | 1930<br>1932<br>1935                                         | o+<br>Z+<br>S                          | re<br>re<br>re                                 | 2550<br>2650<br>3210                             | 23/25/32/<br>18,5/7,8<br>53/36        | EB II.o<br>Status nach 2<br>toten Kindern                                     | Peritonitis                      |                                  |

| Lfd. Nr. | Krbl. Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav. dauer | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                           | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|----------|-----------|------|-------|------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 71       | 721/1934  | L.O. |       | 1928             | Z   | re 3000     |                                               | 25,5/27,5<br>30/17,5/<br>8,8          | EB II.°<br>Litzmann'-Obliqui-<br>tät                                                               |                                  |                                  |
|          |           |      | 31    | 1930             | o   | re 3950     |                                               |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |
|          |           |      |       | 1934             | S   | re 3700     | 55/35                                         |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |
| 72       | 7/1934    | S.M. |       | 1925             | o+  | re 3500     |                                               | 25,5/27,5<br>32/18/7,8                | EB II.°<br>Absinkende Herztöne                                                                     |                                  |                                  |
|          |           |      |       | 1926             | o   | re 2500     |                                               |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |
|          |           |      |       | 1927             | o   | re 2900     |                                               |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |
|          |           |      |       | 1928             | o   | re 3000     |                                               |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |
|          |           |      | 32    | 1934             | S   | 21pt 3380   | 51/34                                         |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |
| 73       | 358/1933  | K.B. |       | 1929             | o+  | pt ?        |                                               | 24/27,5/<br>29/17,5/<br>7,9           | EB II.°<br>Vorzeitiger Blasen-<br>sprung; 3 frustane<br>Geburten                                   |                                  |                                  |
|          |           |      |       | 1930             | Z+  | pt 4750     |                                               |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |
|          |           |      |       | 1931             | Z+  | pt 4875     |                                               |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |
|          |           |      | 37    | 1933             | S   | 35pt 4180   | 57/37                                         |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |
| 74       | 336/1933  | S.A. |       | 1921             | o   | re 3250     |                                               | 25/28/30/<br>16/7,9                   | EB II.°<br>Frequente Herztöne<br>2 frustane Geburten                                               |                                  |                                  |
|          |           |      |       | 1922             | F+  | M.VIII 3000 |                                               |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |
|          |           |      |       | 1924             | o   | re 3625     |                                               |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |
|          |           |      |       | 1929             | o+  | re 4020     |                                               |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |
|          |           |      | 41    | 1933             | S   | re 3550     | 55/36                                         |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |
| 75       | 262/1933  | O.J. |       | 1922             | o+  | re ?        |                                               | 28/30,5/<br>34,5/21/8                 | EB II.°<br>Uterus arcuatus;<br>frühzeitiger Blasen-<br>sprung; frustane Ge-<br>burten bei Querlage |                                  |                                  |
|          |           |      |       | 1925             | o+  | re 3500     |                                               |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |
|          |           |      |       | 1928             | o+  | re ?        |                                               |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |
|          |           |      | 34    | 1933             | S   | 8at 4050    | 55/35                                         |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |
| 76       | 217/1933  | S.B. |       | 1931             | F+  | M.VIII ?    |                                               | 22/23/27/<br>16,5/8                   | EB II.°<br>Frühzeitiger Blasen-<br>sprung; 2 frustane<br>Geburten                                  |                                  |                                  |
|          |           |      |       | 1932             | Z+  | re ?        |                                               |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |
|          |           |      | 27    | 1933             | S   | re 4000     | 56/37                                         |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |
| 77       | 54/1933   | S.E. |       | 1929             | o   | re 3550     |                                               | 28/26/31/<br>17/8,5                   | EB II.°<br>Frequente Herztöne                                                                      |                                  |                                  |
|          |           |      |       | 1932             | S   | re 4200     | 54/36                                         |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |
|          |           |      | 30    | 1933             | S   |             |                                               |                                       |                                                                                                    |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav.   | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                     | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|----------|------|-------|------------------|-----|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 78      | 1/1933   | K.A. |       | 1920             | Z   | re      | 5000                                          | 25/28/32/<br>18,5/8,4                 | EB II.0<br>Uterus myomatosus;<br>Verlage; 4 frustra-<br>ne Geburten          |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1922             | O   | re      | 3500                                          |                                       |                                                                              |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1923             | O   | re      | 3000                                          |                                       |                                                                              |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1924             | O   | re      | 3000                                          |                                       |                                                                              |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1926             | O   | re      | 2500                                          |                                       |                                                                              |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1928             | F+  | M. VIII | ?                                             |                                       |                                                                              |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1930             | O+  | re      | 4100                                          |                                       |                                                                              |                                  |                                  |
|         |          |      | 36    | 1933             | S+  | re      | 1650                                          | 43/30,5                               |                                                                              |                                  |                                  |
| 79      | 499/1932 | H.G. |       | 1922             | O+  | re      | 3500                                          | 25/28/31/<br>17/8,4                   | EB II.0<br>Verlage; schwanken-<br>de Herztöne; Symphy-<br>sensporn           |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1924             | O   | re      | 3000                                          |                                       |                                                                              |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1927             | O   | re      | 3300                                          |                                       |                                                                              |                                  |                                  |
|         |          |      | 34    | 1932             | S   | re      | 3750                                          | 57/37                                 |                                                                              |                                  |                                  |
| 80      | 444/1932 | H.E. |       | 1926             | Z   | re      | 3250                                          | 26,5/28,5<br>30/17,5/<br>8,1          | EB II.0<br>Starkes Mißverhält-<br>nis; Großes Kind; ab-<br>sinkende Herztöne |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1928             | A   | M. II   | --                                            |                                       |                                                                              |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1930             | O   | apt     | 3350                                          |                                       |                                                                              |                                  |                                  |
|         |          |      | 38    | 1932             | S   | re      | 3750                                          | 53/39                                 |                                                                              |                                  |                                  |
| 81      | 157/1932 | H.A. |       | 1930             | O+  | re      | 3000                                          | 26/28/31/<br>19/7,8                   | EB II.0<br>Status nach 2 toten<br>Kindern                                    |                                  |                                  |
|         |          |      | 31    | 1931             | Z+  | re      | ?                                             |                                       |                                                                              |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1932             | S   | re      | 2950                                          | 50/35                                 |                                                                              |                                  |                                  |
| 82      | 301/1930 | H.R. |       | 1928             | O+  | re      | 3750                                          | 23/27/31/<br>18/8,6                   | EB II.0<br>Frühzeitiger Blasen-<br>sprung; Großes Kind                       |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1929             | A   | M. II   | --                                            |                                       |                                                                              |                                  |                                  |
|         |          |      | 23    | 1930             | S   | re      | 3900                                          | 52/38                                 |                                                                              |                                  |                                  |
| 83      | 672/1929 | W.B. |       | 1924             | O   | re      | ?                                             | 28/31,5/<br>33/18,5/8                 | EB II.0<br>Platrrachitisches<br>Becken; abgewichener<br>Kopf                 |                                  |                                  |
|         |          |      | 27    | 1925             | O   | re      | 3250                                          |                                       |                                                                              |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1929             | S   | re      | 3500                                          | 51/35                                 |                                                                              |                                  |                                  |
| 84      | 498/1928 | M.A. |       | 1920             | O+  | re      | 4500                                          | 25/28/32/<br>17,5/                    | EB II.0<br>Uterusruptur                                                      |                                  |                                  |
|         |          |      | 34    | 1928             | S   | re      | 3350                                          | 57/35                                 |                                                                              | Herzinsuffi-<br>zienz, Anämie    |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav. dauer | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                                                                                                                                                                | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|----------|------|-------|------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 85      | 528/1926 | S.M. |       | 1911 o+          |     | re          | ?                                             | 30/32,5/<br>36/19/7,5                 | EB II. o<br>Querlage; Status<br>nach 6 toten<br>Kindern                                                                                                                                                                                 |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1912 o+          |     | re          | ?                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1913 o           |     | re          | ?                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1915 o+          |     | re          | ?                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1919 o+          |     | re          | ?                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1920 o           |     | re          | ?                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1922 o+          |     | re          | ?                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1925 o+          |     | re          | ?                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         | 38       |      |       | 1926 S           |     | 14pt        | 3100                                          | 50/32,5                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
| 86      | 276/1946 | H.A. |       | 1936 o+          |     | re          | 2500                                          | 25/27,5/<br>29/18/                    | EB II. o<br>Litzmann'-Obli-<br>quität; frühzei-<br>tiger Blasenprung                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1945 A           |     | M.II        | --                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         | 35       |      |       | 1946 S           |     | 6pt         | 3670                                          | 52/35                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
| 87      | 275/1943 | M.M. |       | 1941 Z+          |     | re          | 3600                                          | 26/28/30/<br>18/5/8,2                 | EB II. o<br>Querlage                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1942 S           |     | 7at         | 3030                                          | 50/37                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
| 88      | 155/1942 | J.H. |       | 1938 A           |     | M.III       | --                                            | 24/26/29/<br>18/8,9                   | EB II. o<br>Status nach Forceps<br>mit Laesio vesicae                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1940 Z           |     | re          | 3190                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1941 A           |     | M.III       | --                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1942 S           |     | 21pt        | 2790                                          | 49/37                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
| 89      | 9/1932   | H.M. |       | 1928 o           |     | re          | 3500                                          | 26/27/30/<br>18/7,9                   | EB II. o<br>Naegele'-Obliquität                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1932 S           |     | re          | 4300                                          | 60/38                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
| 90      | 75/1930  | S.F. |       | 1920 o           |     | re          | 3250                                          | 24/29/34<br>18/8,5                    | EB II. o<br>Prophylactische<br>Sectio; Vorzeitiger<br>Blasenprung; stell-<br>te normale Geburts-<br>arbeit in Frage. Bei<br>letzter Geburt durch<br>Wendung und Extrac-<br>tion wurde mit knap-<br>per Not ein lebendes<br>Kind erzielt |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1925 Z           |     | re          | 2800                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1926 o           |     | re          | 3300                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
|         | 34       |      |       | 1930 S           |     | 9pt         | 3400                                          | 54/36                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr                        | Art | Grav.                                                   | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                                                                                                                | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|----------|------|-------|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 91      | 19/1927  | B.M. |       | 1921 Z<br>1923 o<br>1925 o<br>1927 S    |     |                                                         | re 4750<br>re 4750<br>re 4500<br>re 3650      | ?/?/?/?/<br>7,8<br>52/36              | EB II. <sup>o</sup><br>Großer Kopf, abge-<br>wichen; schwanken-<br>de Herztöne; 2 x<br>Embolie post partum                                                                              | Lungenembolie                    |                                  |
| 92      | 310/1943 | S.M. |       | 1939 F+<br>1940 F+<br>1942 o+<br>1943 S |     | M.? 2200 aus-<br>M.? 2400 warts<br>re 3600 "<br>re 3180 | 26/27,5/<br>30,5/18,5<br>7,5<br>51/38         |                                       | EB III. <sup>o</sup><br>Status nach 3 toten<br>Kindern                                                                                                                                  |                                  |                                  |
| 93      | 181/1943 | H.H. |       | 1941 o+<br>1943 S                       |     | re 4500 ausw.<br>re 3970                                | 25,5/27,5<br>29,5/19,5<br>1,5<br>54/40        |                                       | EB III. <sup>o</sup><br>Mißverhältnis                                                                                                                                                   |                                  |                                  |
| 94      | 111/1941 | T.E. |       | 1936 o<br>1938 Perf.<br>1941 S          |     | re 3000 ausw.<br>re 3350<br>14at 3000                   | 26/29/35/<br>19/7,4-5<br>51/35                |                                       | EB III. <sup>o</sup> ein Kind<br>durch Geb. trauma<br>geschädigt (nicht<br>laufen, nicht pre-<br>chen) 2. Kd. unter der<br>Geb. abgestorben.<br>Dringender Wunsch<br>nach lebendem Kind |                                  |                                  |
| 95      | 972/1935 | S.B. |       | 1923 Z<br>1933 o<br>1935 o+<br>1935 S   |     | re 2800 ausw.<br>re 2300 "<br>re 3500 "<br>15pt 2900    | 27/28/29/<br>16/7,25<br>51/34                 |                                       | EB III.<br>verlangsamte kind-<br>liche Herztöne                                                                                                                                         |                                  |                                  |
| 96      | 633/1933 | H.A. |       | 1930 Z+<br>1932 o+<br>1933 S            |     | re ? ausw.<br>re ?<br>5pt 3150                          | 26,5/29/<br>51/18/6,7<br>53/34                |                                       | EB III.<br>Uterus arcuatus;<br>Querlage                                                                                                                                                 |                                  |                                  |
| 97      | 736/1932 | H.M. | 40    | 1929 Z<br>1932 S                        |     | re 1750 ausw.<br>14at 2900                              | 25,5/27/<br>31/18/6,9                         |                                       | EB III. <sup>o</sup><br>Nephropathia grav.<br>Vorzeitiger Blasen-<br>sprung; alte II para;<br>Symphysensporn                                                                            |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Frbl.Nr.  | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art    | Grav. Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera     | Indikation<br>zur Sectio                             | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|-----------|------|-------|------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 98      | 221/1932  | F.K. | 1927  | o+               | re     | 2100                                                | Maze- 24/25,5/<br>ration<br>I.Gra-<br>des | EB III.o<br>Rachitischer<br>Zwergwuchs;<br>Eklampsie | Obd.-bef.<br>fehlt<br>unreif     |                                  |
| 99      | 640/1928  | T.B. | 1932  | S                | M.VIII | 1500                                                | 41/29 30/16/6,8                           | EB III.o                                             |                                  |                                  |
|         |           |      | 1925  | Z+F              | VII    | 2000                                                | ausw. 27/28/31/                           | EB III.o                                             |                                  |                                  |
|         |           |      | 1927  | Z+               | re     | 2750                                                | " 15,5/7,1                                | Flattrachitisches                                    |                                  |                                  |
|         |           |      | 1928  | S                | re     | 3450                                                | 53/36,5                                   | Becken                                               |                                  |                                  |
| 100     | 114/1927  | R.M. | 1916  | o                | re     | 2250                                                | ausw. 25/26,5                             | EB III.o                                             |                                  |                                  |
|         |           |      | 1917  | o                | re     | 2500                                                | " 30/19/7,4                               | Abgewichene                                          |                                  |                                  |
|         |           |      | 1921  | o                | re     | 2750                                                | "                                         | Schädellage                                          |                                  |                                  |
|         |           |      | 1925  | A                | M.VI   | --                                                  |                                           |                                                      |                                  |                                  |
|         |           |      | 1927  | S                | 14pt   | 3300                                                | 53/34,5                                   |                                                      |                                  |                                  |
| 101     | 1096/1952 | L.A. | 1950  | o                | ?      | 3250                                                | 27/29/30/                                 | Pl.pr.cent.                                          |                                  |                                  |
|         |           |      | 1951  | o                | ?      | 3250                                                | 20,5/                                     |                                                      |                                  |                                  |
|         |           |      | 1952  | A                | ?      | --                                                  |                                           |                                                      |                                  |                                  |
| 102     | 1060/1952 | B.K. | 1952  | S                | 28at   | 1700                                                | 45/?                                      | Pl.pr.cent.                                          |                                  |                                  |
|         |           |      | 1933  | o                | re     | 4000                                                | 26/27,5/                                  |                                                      |                                  |                                  |
|         |           |      | 1935  | o                | re     | 5000                                                | 30/20/                                    |                                                      |                                  |                                  |
|         |           |      | 1936  | o                | re     | 3500                                                |                                           |                                                      |                                  |                                  |
|         |           |      | 1937  | o                | re     | 3000                                                |                                           |                                                      |                                  |                                  |
|         |           |      | 1938  | o                | re     | ?                                                   |                                           |                                                      |                                  |                                  |
|         |           |      | 1940  | o                | re     | 2500                                                |                                           |                                                      |                                  |                                  |
|         |           |      | 1943  | o                | re     | 2000                                                |                                           |                                                      |                                  |                                  |
|         |           |      | 1945  | o                | re     | 2500                                                |                                           |                                                      |                                  |                                  |
|         |           |      | 1951  | o                | re     | 2500                                                |                                           |                                                      |                                  |                                  |
| 103     | 1018/1952 | S.H. | 1952  | S                | 18at   | 2280                                                | 48/34                                     |                                                      |                                  |                                  |
|         |           |      | 1942  | o                | re     | 3500                                                | 25/27,5/                                  | Pl.pr.cent.                                          |                                  |                                  |
|         |           |      | 1949  | S                | re     | 2940                                                | 31,5/19,5                                 |                                                      |                                  |                                  |
| 104     | 154/1952  | E.H. | 1943  | o                | re     | 3770                                                | 25,5/28,5/                                | Pl.pr.cent.                                          |                                  |                                  |
|         |           |      | 1952  | S                | 18at   | 3900                                                | 31/21/                                    |                                                      |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr.  | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav. | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                 | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes                                                  |
|---------|-----------|------|-------|------------------|-----|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 105     | 737/1951  | H.M. |       | 1940             | Z   | re    | 3500                                          | 26/28/31/<br>20/                      | Pl.pr.cent.                                              |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 1941             | o   | re    | 3500                                          |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 1942             | o   | re    | ?                                             |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 1944             | o   | re    | 3000                                          |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 1945             | o   | re    | ?                                             |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         | 36        |      |       | 1951             | S   | 8at   | 3740                                          | 52/36                                 |                                                          |                                  |                                                                                   |
| 106     | 41/1951   | H.E. |       | 1938             | o   | re    | 2500                                          | 27/29/<br>31,5/20/                    | Pl.pr.cent.                                              |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 1943             | o   | re    | 2500                                          |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 1947             | o   | re    | 2500                                          |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 1948             | o   | re    | 2500                                          |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 1950             | A   | II    | --                                            |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         | 31        |      |       | 1951             | S   | 3at   | 2330                                          | 48/34                                 |                                                          |                                  |                                                                                   |
| 107     | 1112/1950 | H.M. |       | 1948             | o   | 20at  | 2890                                          | 25/30/32/<br>20/                      | Pl.pr.cent.                                              |                                  |                                                                                   |
|         | 22        |      |       | 1950             | S   | VII   | 2150                                          | 44/31                                 |                                                          |                                  |                                                                                   |
| 108     | 573/1950  | S.E. |       | 1938             | o   | 21at  | 2500                                          | 23/26/31/<br>19,5/                    | Pl.pr.cent.<br>Starke Blutung<br>vor Klinikauf-<br>nahme |                                  | Obd.-bef.<br>fehlt<br>weiße As-<br>phyxie<br>(2150 g)                             |
|         |           |      |       | 1940             | o   | 21at  | 3500                                          |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 1943             | o   | 21at  | 3500                                          |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 1947             | o   | 21at  | 3600                                          |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 1949             | A   | III   | --                                            |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         | 28        |      |       | 1950             | S+  | VIII  | 2150                                          | 47/?                                  |                                                          |                                  |                                                                                   |
| 109     | 442/1950  | K.A. |       | 1941             | o   | re    | 3900                                          | 25/29/<br>33,5/21/                    | Pl.pr.cent.                                              |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 1949             | A   | IV    | --                                            |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
| 110     | 429/1950  | A.E. |       | 1950             | S   | 20at  | 3350                                          | 53/34                                 |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 19 ?             | o   | ?     | ?                                             | 9/9/9/9/                              |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         | 23        |      |       | 1950             | S+  | IX    | 2000                                          | 47/39,5                               |                                                          |                                  |                                                                                   |
| 111     | 397/1950  | P.R. |       | 1930             | o   | re    | 5000                                          | 25/27,5/<br>32/20/                    | Pl.pr.cent.<br>ante op. 1150 g<br>Blutverlust            |                                  | Apnoisch geb.<br>Obd.-bef.<br>fehlt<br>Frühgeburt<br>(Kind starb)<br>nach 4 Std.) |
|         |           |      |       | 1933             | o   | re    | 5000                                          |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 1935             | o   | re    | 4000                                          |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 1938             | o   | re    | ?                                             |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 1939             | o   | re    | ?                                             |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 1940             | o   | re    | ?                                             |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 1941             | o   | re    | ?                                             |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 1943             | o   | re    | ?                                             |                                       |                                                          |                                  |                                                                                   |
|         |           |      |       | 1950             | S   | VII   | 2420                                          | 50/?                                  |                                                          |                                  |                                                                                   |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr.  | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr                                                             | Art                                  | Grav.                                                                                 | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang               | Becken-<br>maße<br>ap/c/t/<br>ex/vera    | Indikation<br>zur Sectio | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|-----------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 112     | 333/1950  | W.E. | 32    | 1941 o<br>1948 o<br>1950 s                                                   | o<br>s                               | re ?<br>9pt                                                                           | 3600<br>52/34                                               | 27,5/30,5<br>34,5/20/                    | Pl.pr.cent.              |                                  |                                  |
| 113     | 174/1950  | F.P. | 32    | 1930 o<br>1933 o<br>1935 o<br>1948 A                                         | o<br>o<br>o<br>A                     | re 4250<br>re 4250<br>re 4250<br>?                                                    | 4250<br>4250<br>4250<br>--                                  | 27/29,5/<br>33,5/21,5                    | Pl.pr.cent.              |                                  |                                  |
| 114     | 1003/1949 | J.H. | 43    | 1934 o<br>1935 o<br>1937 o<br>1938 o<br>1941 o<br>1943 o<br>1944 o<br>1949 s | o<br>o<br>o<br>o<br>o<br>o<br>o<br>s | re 3200<br>VIII 2200<br>IX 2320<br>re 4000<br>re 3500<br>re ?<br>re ?<br>re ?<br>14pt | 3200<br>2200<br>2320<br>4000<br>3500<br>?<br>?<br>?<br>3700 | 24/28/<br>33,5/20/<br>27/29,5/<br>33/21/ | Pl.pr.cent.              |                                  |                                  |
| 115     | 825/1949  | B.M. | 26    | 1934 o<br>1935 o<br>1937 o<br>1938 o<br>1941 o<br>1943 o<br>1944 o<br>1949 s | o<br>o<br>o<br>o<br>o<br>o<br>o<br>s | re 3200<br>VIII 2200<br>IX 2320<br>re 4000<br>re 3500<br>re ?<br>re ?<br>re ?<br>14pt | 3200<br>2200<br>2320<br>4000<br>3500<br>?<br>?<br>?<br>3700 | 24/28/<br>33,5/20/<br>27/29,5/<br>33/21/ | Pl.pr.cent.              |                                  |                                  |
| 116     | 722/1949  | S.H. | 35    | 1938 o<br>1939 A<br>1940 o<br>1949 s                                         | o<br>A<br>o<br>s                     | re 2300<br>II<br>2lat 2600<br>2lat 2750                                               | 2300<br>--<br>2600<br>2750                                  | 27,5/30,5<br>34,5/20/                    | Pl.pr.cent.              |                                  |                                  |
| 117     | 579/1949  | E.J. | 35    | 1939 o<br>1942 o<br>1942 o<br>1942 s                                         | o<br>o<br>o<br>s                     | re 3500<br>re 3500<br>re 3500<br>re 4220                                              | 3500<br>3500<br>3500<br>4220                                | 26,5/28/<br>32/?/?                       | Pl.pr.cent.              |                                  |                                  |
| 118     | 231/1949  | P.A. | 27    | 1945 o<br>1947 F<br>1949 s                                                   | o<br>F<br>s                          | pt 3000<br>? 3500<br>8at 3200                                                         | 3000<br>3500<br>3200                                        | 26/30/33/<br>19                          | Pl.pr.cent.              |                                  |                                  |
| 119     | 142/1949  | A.M. | 32    | 1943 o<br>1942 s                                                             | o<br>s                               | re 3500<br>12at 3200                                                                  | 3500<br>3200                                                | 27,5/31/<br>32/22                        | Pl.pr.cent.              |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr                                                                         | Art | Grav. Kind<br>dauer | Kopf-<br>Größe/<br>Gewicht/<br>Kopfr-<br>umfang                                                       | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|----------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 120     | 583/1948 | W.H. | 34    | 1944 o<br>1948 s                                                                         | -   | -                   | re 4000<br>VIII 2420 48/33                                                                            | 26/30<br>32,5/21,5                    | Pl.pr.cent.              | -                                | -                                |
| 121     | 101/1948 | T.M. | -     | 1939 o<br>1940 o<br>1945 o<br>1948 s                                                     | -   | -                   | re 3500<br>re 3500<br>re 3500<br>10at 3820 52/35                                                      | 27/30/33/<br>21,5/                    | Pl.pr.cent.              | -                                | -                                |
| 122     | 349/1947 | K.M. | 37    | 1941 o<br>1947 s                                                                         | -   | -                   | re 3000<br>IX 2800 50/33                                                                              | 25/27,5/<br>30/20,5/                  | Pl.pr.cent.              | -                                | -                                |
| 123     | 534/1947 | G.R. | 33    | 1934 z<br>1938 z<br>1947 s                                                               | -   | -                   | re 3000<br>re 4000<br>10at 3200 50/33                                                                 | 24/27/31/<br>20/                      | Pl.pr.cent.              | -                                | -                                |
| 124     | 418/1942 | M.V. | 38    | 1938 z<br>1942 s                                                                         | -   | -                   | re 3500<br>14at 3410 53/36                                                                            | 25/28,5/<br>31,5/21/                  | Pl.pr.cent.              | Peritonitis                      | -                                |
| 125     | 732/1937 | K.A. | 32    | 1933 o<br>1936 A<br>1937 s                                                               | -   | -                   | re 4000<br>III --<br>17at 2970 51/36,5                                                                | 27/30,5/<br>34/20/                    | Pl.pr.cent.              | -                                | -                                |
| 126     | 882/1936 | S.G. | 43    | 1928 o<br>1936 s                                                                         | -   | -                   | re 3250<br>17pt 3270 53/36                                                                            | 25/26/31/<br>19/                      | Pl.pr.cent.              | -                                | -                                |
| 127     | 693/1933 | F.K. | 32    | 1919 o<br>1925 o+<br>1927 o<br>1928 o+<br>1931 o<br>1933 s                               | -   | -                   | re 2000<br>re ?<br>re 3500<br>re 3500<br>re 3500<br>X 3050 52/35                                      | 26/28,5/<br>31/20/                    | Pl.pr.cent.              | -                                | -                                |
| 128     | 560/1928 | M.K. | 39    | 1909 o+<br>1911 o<br>1912 o<br>1914 o<br>1919 o<br>1921 o<br>1924 z+<br>1926 z<br>1928 s | -   | -                   | re 4500<br>re 4000<br>re 3700<br>re 3500<br>re 4000<br>re 3800<br>re 4500<br>re 3500<br>re 3650 52/36 | 30/31,5/<br>33/20/                    | Pl.pr.cent.              | Peritonitis<br>Anaemie           | -                                |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav. | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|----------|------|-------|------------------|-----|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 129     | 339/1927 | E.B. |       | 1920             | Z   |       | re 3750                                       | 23,5/26,5                             | Pl. pr. centr.           |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1922             | o   |       | re 3250                                       | 31,5/20,5                             |                          |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1924             | o   |       | re 3825                                       |                                       |                          |                                  |                                  |
|         | 43       |      |       | 1927             | S   |       | 5at 3500 53/36                                |                                       |                          |                                  |                                  |
| 130     | 287/1927 | B.A. |       | 1922             | o   |       | re 3500                                       | 25/28,5/<br>32/21/                    | Pl. pr. centr.           |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1924             | o   |       | re ?                                          |                                       |                          |                                  |                                  |
|         | 20       |      |       | 1927             | S   |       | IX 2900 52/34                                 |                                       |                          |                                  |                                  |
| 131     | 266/1926 | S.S. |       | 1922             | o   |       | re ?                                          | 23/27/28/<br>19,5/                    | Pl. pr. centr.           |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1923             | o   |       | re ?                                          |                                       |                          |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1924             | o   |       | re ?                                          |                                       |                          |                                  |                                  |
|         | 34       |      |       | 1926             | S   |       | 14at 2150 47/34                               |                                       |                          |                                  |                                  |
| 132     | 406/1925 | H.R. |       | 1920             | A   |       | III --                                        | 26/29/31/<br>21/                      | Pl. pr. centr.           | Sepsis                           |                                  |
|         |          |      |       | 1921             | o   |       | re 2500                                       |                                       |                          | Abszeß am 2. Finger,             |                                  |
|         |          |      |       | 1922             | o   |       | re 4000                                       |                                       |                          | Abszeß d. Glaskörpers            |                                  |
|         | 36       |      |       | 1925             | S   |       | 11at 2900 49/34                               |                                       |                          | des re. Auges                    |                                  |
| 133     | 83/1925  | R.A. |       | 1920             | F+  |       | VII ?                                         | 27/28,5/<br>32/19,5/                  | Pl. pr. centr.           |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1921             | o   |       | re ?                                          |                                       |                          |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1922             | o   |       | re ?                                          |                                       |                          |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1923             | o   |       | re ?                                          |                                       |                          |                                  |                                  |
|         | 31       |      |       | 1931             | S   |       | re 2950 50/34,5                               |                                       |                          |                                  |                                  |
| 134     | 321/1947 | P.E. |       | 1946             | o   |       | re 3600                                       | 25/28/<br>20,5/21/                    | Pl. pr. centr.           |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1947             | S   |       | 21at 3200 53/35                               |                                       |                          |                                  |                                  |
| 135     | 37/1938  | M.R. |       | 1929             | o   |       | re 3550                                       | 27/29/31/<br>20/                      | Pl. pr. centr.           |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1931             | o   |       | re 2800                                       |                                       |                          |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1936             | o   |       | re 3050                                       |                                       |                          |                                  |                                  |
|         | 38       |      |       | 1938             | S   |       | 14at 2270 50/32                               |                                       |                          |                                  |                                  |
| 136     | 765/1952 | H.H. |       | 1941             | o   |       | re ?                                          | 24/27/30/<br>19,5/                    | Pl. pr. lat.             |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1947             | S   |       | re 3240 52/33                                 |                                       |                          |                                  |                                  |
| 137     | 549/1949 | B.R. |       | 1947             | o   |       | re 4000                                       | 28/29,5/<br>31/21/                    | Pl. pr. lat.             |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1949             | S   |       | 14at 3150 50/34                               |                                       |                          |                                  |                                  |
| 138     | 432/1948 | G.E. |       | 1944             | o   |       | re 3500                                       | ?/2/2/2/                              | Pl. pr. lat.             |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1945             | o   |       | re 3500                                       |                                       |                          |                                  |                                  |
|         | 28       |      |       | 1948             | S   |       | 4pt 3500 52/32,5                              |                                       |                          |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav. | Kind<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Indikation<br>zur Sectio | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|----------|------|-------|------------------|-----|-------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 139     | 454/1941 | M.M. |       | 1932             | A   | VI    | --                                |                          | 25/28/32/<br>20,5/                    |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1938             | o   | re    | 3500                              |                          |                                       |                                  |                                  |
|         |          |      | 35    | 1941             | S   | 2lat  | 2700 50/33,5                      |                          |                                       |                                  |                                  |
| 140     | 317/1940 | S.K. |       | 1938             | o   | re    | 3650                              |                          | 27/29/31/<br>20                       |                                  |                                  |
|         |          |      | 25    | 1940             | o   | re    | 3300                              |                          |                                       |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1938             | o   | 14at  | 2950 50/34                        |                          |                                       |                                  |                                  |
| 141     | 205/1940 | A.S. |       | 1928             | o   | re    | ?                                 |                          | 24/26,5/<br>31/21                     |                                  |                                  |
|         |          |      | 32    | 1940             | S   | 10at  | 2350 48/32                        |                          |                                       |                                  |                                  |
| 142     | 725/1938 | H.A. |       | 1929             | o   | re    | ?                                 |                          |                                       |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1931             | o   | re    | 3000                              |                          | 27/28,5/<br>31/19,5/<br>10,5          |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1932             | A   | II    | --                                |                          |                                       |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1933             | o   | re    | 3400                              |                          |                                       |                                  |                                  |
|         |          |      | 35    | 1938             | S   | re    | 2950 52/34                        |                          |                                       |                                  |                                  |
| 143     | 514/1928 | B.J. |       | 1923             | o   | re    | ?                                 |                          | 30/32/35/<br>20/                      |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1924             | o   | re    | ?                                 |                          |                                       |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1925             | A   | V     | --                                |                          |                                       |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1926             | A   | IV    | --                                |                          |                                       |                                  |                                  |
|         |          |      | 28    | 1928             | S   | 6at   | 3000 53/32,5                      |                          |                                       |                                  |                                  |
| 144     | 321/1927 | E.B. |       | 1909             | o   | re    | ?                                 |                          | 25/28/<br>31,5/19/                    |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1910             | o   | re    | ?                                 |                          |                                       |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1913             | o   | re    | ?                                 |                          |                                       |                                  |                                  |
|         |          |      | 43    | 1927             | S   | re    | 3400 54/35                        |                          |                                       |                                  |                                  |
| 145     | 517/1925 | L.T. |       | 1921             | o   | re    | 2700                              |                          | 24,5/27,5<br>32,5/21                  |                                  |                                  |
|         |          |      | 29    | 1925             | S   | re    | 2800 51/34                        |                          |                                       |                                  |                                  |
| 146     | 1/1927   | L.G. |       | 1909             | o   | ?     | ?                                 |                          | 26/29/32/<br>Pl.pr.lat.               |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1911             | o   | ?     | ?                                 |                          |                                       |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1912             | o   | ?     | ?                                 |                          |                                       |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1913             | o   | ?     | ?                                 |                          |                                       |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1914             | o   | ?     | ?                                 |                          |                                       |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1916             | o   | ?     | ?                                 |                          |                                       |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1918             | o   | ?     | ?                                 |                          |                                       |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1920             | o   | ?     | ?                                 |                          |                                       |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1921             | o   | ?     | ?                                 |                          |                                       |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1923             | o   | ?     | ?                                 |                          |                                       |                                  |                                  |
|         |          |      | 44    | 1927             | S   | 12at  | 2500 9/2                          |                          |                                       |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav. | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes               |
|---------|----------|------|-------|------------------|-----|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 147     | 858/1952 | S.T. |       | 1944             | o   | re    | 3250                                          | ?                                     | Pl.pr.marg.              |                                  |                                                |
|         |          |      |       | 1951             | o   | re    | 3250                                          |                                       |                          |                                  |                                                |
|         | 31       |      |       | 1952             | S   | 17at  | 3350 53/34                                    |                                       |                          |                                  |                                                |
| 148     | 994/1951 | S.R. |       | 1945             | o   | 14at  | 3750                                          | 29/31/34/                             | Pl.pr.marg.              |                                  |                                                |
|         |          |      |       | 1947             | o   | re    | 4000                                          | 21                                    |                          |                                  |                                                |
|         |          |      |       | 1949             | o   | re    | 4050                                          |                                       |                          |                                  |                                                |
|         | 39       |      |       | 1951             | S   | re    | 3900 54/36                                    |                                       |                          |                                  |                                                |
| 149     | 434/1947 | S.G. |       | 1933             | o   | re    | ?                                             | ?                                     | Pl.pr.marg.              |                                  |                                                |
|         |          |      |       | 1943             | o   | re    | ?                                             |                                       |                          |                                  |                                                |
|         |          |      |       | 1945             | o   | re    | ?                                             |                                       |                          |                                  |                                                |
|         | 40       |      |       | 1947             | S   | re    | 3140 52/33                                    |                                       |                          |                                  |                                                |
| 150     | 416/1945 | M.L. |       | 1931             | o   | re    | 3000                                          |                                       | Pl.pr.marg.              |                                  |                                                |
|         |          |      |       | 1933             | A   | III   | --                                            |                                       |                          |                                  |                                                |
|         |          |      |       | 1938             | o   | re    | 3500                                          | 26/29/32/                             |                          |                                  | Es liegt<br>kein Obduk-<br>tionsber.vor.       |
|         | 39       |      |       | 1945             | S+  | 8pt   | 3500 57/36                                    |                                       |                          |                                  |                                                |
| 151     | 41/1934  | H.H. |       | 1930             | o   | re    | 2500                                          | ?                                     | Pl.pr.marg.              |                                  |                                                |
|         | 25       |      |       | 1934             | S   | 22at  | 3000 51/34                                    |                                       |                          |                                  |                                                |
| 152     | 543/1930 | K.B. |       | 1922             | o   | re    | ?                                             | 27/30/35/                             | Pl.pr.marg.              | Anaemie                          | Struma cong.mit<br>Trachealstenose<br>Asphyxie |
|         |          |      |       | 1922             | o   | re    | ?                                             | 21/                                   |                          |                                  |                                                |
|         |          |      |       | 1924             | o   | re    | ?                                             |                                       |                          |                                  |                                                |
|         |          |      |       | 1925             | 0+  | re    | ?                                             |                                       |                          |                                  |                                                |
|         |          |      |       | 1925             | 0+  | re    | ?                                             |                                       |                          |                                  |                                                |
|         |          |      |       | 1927             | o   | re    | ?                                             |                                       |                          |                                  |                                                |
|         |          |      |       | 1928             | o   | re    | ?                                             |                                       |                          |                                  |                                                |
|         | 36       |      |       | 1930             | S+  | re    | 3200 55/36                                    |                                       |                          |                                  |                                                |
| 153     | 211/1925 | W.H. |       | 1920             | o   | re    | ?                                             | ?                                     | Pl.pr.marg.              |                                  |                                                |
|         | 29       |      |       | 1925             | S   | 21at  | 2500 48/34                                    |                                       |                          |                                  |                                                |
| 154     | 302/1944 | M.n. |       | 1919             | o   | re    | 3250                                          | 25,5/30/                              | Pl.pr.marg.              |                                  |                                                |
|         | 46       |      |       | 1944             | S   | 12pt  | 3640 52/37                                    | 24,5/23,5                             |                          |                                  |                                                |
| 155     | 3/1926   | S.A. |       | 1922             | Z   | 28at  | ?                                             | ?                                     | Pl.pr.marg.              |                                  |                                                |
|         |          |      |       | 1923             | o   | re    | ?                                             |                                       |                          |                                  |                                                |
|         | 33       |      |       | 1926             | S   | 11pt  | 3600 56/36                                    |                                       |                          |                                  |                                                |

| geb. Kind. Nr. | Wohnort  | Geburts-<br>jahr | geb. GröÙe/<br>Kopf-<br>umfang                                                                                                                                                          | geb. Gew.<br>sp/o/t/<br>ex/vera                                                                                  | Induktion<br>zur Sectio | Todes-<br>ursache<br>der Mutter | Todes-<br>ursache<br>des Kindes |
|----------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 156            | 286/1934 | Z.M.             | 1922 o re 2750<br>1923 o re 2750<br>1924 o re 2500<br>1926 o re 2750<br>1927 o re 2750<br>1928 o+ re 2750<br>1929 o re 2500<br>1931 o re 2750<br>1932 o re 2500<br>1934 s re 2050 51/34 | 24/25/31/<br>Pl.pr.                                                                                              |                         |                                 |                                 |
| 157            | 554/1927 | S.K.             | 1921 o re ?<br>1924 o re ?<br>1927 s 14at 3250 51/36                                                                                                                                    | ?/2/2/2/<br>Pl.pr.                                                                                               |                         |                                 |                                 |
| 158            | 336/1927 | S.M.             | 1915 o re ?<br>1920 z re ?<br>1924 o re 3500<br>1927 s 18at 3100 52/35                                                                                                                  | 25,5/29/<br>32/19<br>Pl.pr.                                                                                      |                         |                                 |                                 |
| 159            | 34/1936  | M.B.             | 1929 o re 2000<br>1936 s re 3190 53/35                                                                                                                                                  | 28/31/34/<br>Pl.pr.                                                                                              |                         |                                 |                                 |
| 160            | 49/1930  | F.B.             | 1928 o re 4000<br>1932 s 14at 3350 52/36                                                                                                                                                | ?/2/2/2/<br>Pl.pr.                                                                                               |                         |                                 |                                 |
| 161            | 592/1946 | P.A.             | 1932 A VI --<br>1933 o 14pt 4780<br>1939 A IV --<br>1939 o 8pt 4680<br>1941 z 14pt 4430<br>1943 z re 5100<br>1946 s IX 4650 54/32                                                       | 25,5/29/<br>32/20/<br>Wehenschwäche,<br>trotz medikamentöser<br>Geburtseinkleitung.<br>Schwankende Herz-<br>töne |                         |                                 |                                 |
| 162            | 380/1947 | T.W.             | 1946 re 3370<br>1947 s 21pt 3270 48/36                                                                                                                                                  | 24/26/28/<br>Übertragung<br>Wehenschwäche, primäre.                                                              |                         |                                 |                                 |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr                             | Art                        | Grav.                            | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                                                                                                                                  | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter des Kindes       |
|---------|----------|------|-------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 163     | 79/1947  | G.M. | 34    | 1941<br>1947                                 | Z<br>S                     | 21pt<br>re                       | 4250<br>3250                                  | 26/30,5/<br>34/21/<br>52/35           | Keine Wehen.<br>Vorzeitiger Blasen-<br>sprung. Der Fröhte<br>Teil des Fruchtwas-<br>sers ist abgegangen.<br>Kopf beweglich über<br>Beckeneingang                                                          |                                                   |
| 164     | 251/1941 | E.M. |       | 1924<br>1926<br>1941                         | o<br>o<br>S                | re<br>re<br>28at                 | 4500<br>3250<br>3100                          | 26,5/29/<br>31/20/<br>50/34           | Uterus myomatosus.<br>Cervicales Myoma<br>praevia. Querlage                                                                                                                                               |                                                   |
| 165     | 520/1940 | S.B. | 32    | 1937<br>1940                                 | o<br>S                     | re<br>7at                        | 2650<br>2870                                  | 26/29/31<br>19,5/<br>52/34            | Cervix-myom.<br>Querlage. Vitium<br>cordis. Vitium<br>monie                                                                                                                                               | Vitium cordis, st. Blut-<br>verlust, Bronchopneu- |
| 166     | 83/1938  | H.B. |       | 1920<br>1922<br>1923<br>1933<br>1935<br>1938 | o<br>o<br>o<br>A<br>A<br>S | re<br>re<br>re<br>IV<br>II<br>re | 3250<br>3250<br>3250<br>--<br>--<br>2720      | ?/?/?/?/<br>?/?/?/?/<br>48/34         | Uterus myomatosus<br>cervical.<br>Myocarditis                                                                                                                                                             |                                                   |
| 167     | 2/1933   | W.B. | 44    | 1914<br>1933                                 | o<br>S                     | re<br>7pt                        | ?<br>2950                                     | 27/31/34/<br>54/34 22                 | Uterus myomatosus.<br>Ansteigende Herztöne                                                                                                                                                                |                                                   |
| 168     | 746/1951 | B.M. | 40    | 1938<br>1951                                 | o<br>S+                    | ?<br>?                           | 2200<br>2420                                  | ?/?/?/<br>17,5/<br>51/?               | Uterusruptur, komplett;<br>extra clinicam. Secun-<br>däre Anaemia & gravis                                                                                                                                | Keine H.T.b. Aufn.<br>Obd.-bef. fehlt             |
| 169     | 39/1950  | H.S. |       | 1939<br>1940<br>1942<br>1943<br>1950         | A<br>o<br>o<br>o<br>S+     | II<br>?<br>?<br>?<br>9pt         | --<br>3000<br>3000<br>3250<br>3500            | 29/32/34/<br>21/<br>56/37             | Torpidie Uterusruptur.<br>Kopf auf Becken auf-<br>gepreßt. Keine Promi-<br>nenz. Beckenmaße nor-<br>mal. Mäßige Wehen.<br>Leise Herztöne. Mutter-<br>mund für 2 Querfinger<br>durchgängig. Vorw. Blispng. | Obd.-bef. fehlt                                   |

| Lfd.Nr. | Ktbl.Nr.  | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav. | Kind<br>Gewicht/<br>Größe<br>Kopf-<br>umfang | Seenen-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Intoxication                                                                                                                         | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes                 |
|---------|-----------|------|-------|------------------|-----|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 170     | 241/1934  | Z.A. |       | 1925             | o+  | re    | 3750                                         | 26/29/32/<br>20                       | Uterus arcuatus.<br>Vorzeitiger Blasen-<br>sprung                                                                                    |                                  |                                                  |
|         |           |      |       | 1926             | o+  | re    | 3750                                         |                                       |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
|         |           |      |       | 1928             | o+  | re    | 3950                                         |                                       |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
|         |           |      |       | 1929             | o   | 4pt   | 4000                                         |                                       |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
|         |           |      |       | 1930             | o+  | 3pt   | 3750                                         |                                       |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
|         |           |      |       | 1932             | A   | III   | --                                           |                                       |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
|         |           |      | 34    | 1934             | S   | 7pt   | 3320                                         | 54/35                                 |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
| 171     | 325/1934  | F.J. |       | 1922             | o   | re    | ?                                            | 24/27/31/<br>19,5/                    | Tetanus uteri.                                                                                                                       |                                  | Asphyxie.<br>Das Kind<br>starb nach<br>4 Stunden |
|         |           |      |       | 1924             | o   | re    | ?                                            |                                       |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
|         |           |      |       | 1925             | A   | V     | --                                           |                                       | Partielle Ablösung<br>der Placenta.Ab-<br>sinkende Herzöne                                                                           |                                  |                                                  |
|         |           |      |       | 1926             | o   | re    | ?                                            |                                       |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
|         |           |      |       | 1927             | A   | III   | --                                           |                                       |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
|         |           |      |       | 1928             | o   | re    | ?                                            |                                       |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
|         |           |      |       | 1930             | o   | re    | 3450                                         |                                       |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
|         |           |      |       | 1931             | o   | re    | 4000                                         |                                       |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
|         |           |      |       | 1932             | o   | re    | 3450                                         |                                       |                                                                                                                                      |                                  | Ob.-bef.<br>fehlt                                |
|         |           |      | 32    | 1934             | S   | 5at   | 2600                                         | 49/34                                 |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
| 172     | 1143/1949 | S.P. |       | 1936             | o   | re    | 2500                                         | 25,5/29,5<br>32/22/                   | Uterus im Dauertonus.QL.<br>eingeklemmt.Kd.bei 2 QF Mm                                                                               |                                  |                                                  |
|         |           |      | 39    | 1940             | o   | re    | 3500                                         |                                       |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
|         |           |      |       | 1949             | S   | 4at   | 3470                                         | 54/34                                 | vorz.Bisspr.wundg.unmöglich                                                                                                          |                                  |                                                  |
| 173     | 597/1940  | H.P. |       | 1936             | o   | IX    | --                                           | 27,5/28,5<br>31/17,5/<br>10/          | Prolapsus subtotalis<br>uteri.Handtellergröße<br>circuläre Portio-<br>erosion.Sectio nach<br>Reponierung des<br>Prolapses            |                                  |                                                  |
|         |           |      | 30    | 1939             | o   | re    | 3620                                         |                                       |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
|         |           |      |       | 1940             | S   | IX    | 2320                                         | 47/31                                 |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
| 174     | 448/1926  | B.E. |       | 1906             | o+  | re    | ?                                            | ?                                     | Eklampsie                                                                                                                            |                                  |                                                  |
|         |           |      | 39    | 1926             | S   | VIII  | 1700                                         | 44/29                                 |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
| 175     | 1231/1939 | B.B. |       | 1930             | o+  | re    | 4250                                         | ?                                     | Nephropathia gravi-<br>dum.Adipöse Frau<br>kommt mit Blutungen;<br>Hypertonie;Ödemen.<br>Herzzustand nicht si-<br>cher zu beurteilen |                                  |                                                  |
|         |           |      |       | 1931             | o+  | re    | 4000                                         |                                       |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
|         |           |      |       | 1935             | o+  | re    | 4000                                         |                                       |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
|         |           |      |       | 1937             | o   | re    | 4000                                         |                                       |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
|         |           |      | 35    | 1939             | S   | 7at   | 4560                                         | 53/36                                 |                                                                                                                                      |                                  |                                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr.  | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav.<br>dauer | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                                    | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter   | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes               |
|---------|-----------|------|-------|------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 176     | 645/1939  | S.E. |       | 1936             | o   | 2lpt           | 3000                                          | 25,5/30,5                             | Nephropathia gravi-                                                                                         |                                    |                                                |
|         |           |      |       | 1937             | o   | re             | 4000                                          | 35/21/<br>10,4                        | darm.Vorzeitiger<br>Blasensprung                                                                            |                                    |                                                |
|         |           |      |       | 1938             | A   | II             | --                                            |                                       |                                                                                                             |                                    |                                                |
|         |           |      |       | 1939             | S   | 4pt            | 4190                                          | 54/36                                 |                                                                                                             |                                    |                                                |
| 177     | 632/1936  | S.D. |       | 1927             | Z   | re             | 2600                                          | 28/30/33/<br>19,5/                    | Nephropathia gravi-                                                                                         |                                    |                                                |
|         |           |      |       | 1929             | ?   | re             | ?                                             |                                       | darm.Hypertonie                                                                                             |                                    |                                                |
|         |           |      |       | 1936             | S   | 8pt            | 3220                                          | 51/35,5                               |                                                                                                             |                                    |                                                |
| 178     | 403/1935  | H.M. |       | 1933             | o+  | re             | ?                                             | 28/32/36/<br>22,5/                    | Nephropathia gravi-                                                                                         |                                    |                                                |
|         |           |      |       | 1934             | o+  | re             | ?                                             |                                       | darm.Querlage;<br>Hydramnion. 2 x in-<br>tra-uteriner Kinds-<br>tod ohne erkannte<br>Ursache                |                                    |                                                |
|         |           |      |       | 1935             | S   | re             | 4050                                          | 52/37,5                               |                                                                                                             |                                    |                                                |
| 179     | 128/1950  | K.R. |       | 1948             | Z   | re             | 4250                                          | 27/30/35/<br>20,5/                    | Nephropathia gravi-                                                                                         |                                    |                                                |
|         |           |      |       | 1950             | S   | re             | 3450                                          | 50/36                                 | darm                                                                                                        |                                    |                                                |
| 180     | 695/1951  | G.A. |       | 1955             | o   | re             | 4400                                          | 25,5/28/<br>29,5/20/                  | Diabetes mellitus;<br>maligne Nephrosclerose;<br>Prae-urämie.<br>Vorzeitige Placentals-<br>talsung          | Uraemie                            | Frühgeburt<br>starb am 2.Tg.<br>kein Obd.-bef. |
|         |           |      |       | 1951             | S   | VII            | 1050                                          | 37/?                                  |                                                                                                             |                                    |                                                |
| 181     | 96/1950   | F.J. |       | 1937             | o   | re             | 3150                                          | 25,5/28,5                             | Steilage bei sämt-<br>lichen Geburten.                                                                      |                                    |                                                |
|         |           |      |       | 1941             | F+  | VII            | ?                                             | 31,5/20,5                             | Status nach 2 Tot-<br>geburten.                                                                             |                                    |                                                |
|         |           |      |       | 1947             | o+  | 14pt           | 3750                                          |                                       |                                                                                                             |                                    |                                                |
|         |           |      |       | 1950             | S   | 56pt           | 3410                                          | 51/35                                 | Übertragung                                                                                                 |                                    |                                                |
| 182     | 546/1952  | S.E. |       | 1945             | Z   | 2lpt           | 3100                                          | 25/26,5/<br>30/19,5/                  | Litzmann-Obliqui-<br>tät                                                                                    |                                    |                                                |
|         |           |      |       | 1950             | S   | 12pt           | 4050                                          | ?                                     |                                                                                                             |                                    |                                                |
| 183     | 610/1947  |      |       | 1939             | Z+  | re             | 3870                                          | 29/32/36/<br>22/9,2                   | Querlage;stärkste<br>Adipositas                                                                             |                                    |                                                |
|         |           |      |       | 1947             | S   | 10pt           | 3400                                          | 55/37                                 |                                                                                                             |                                    |                                                |
| 184     | 1122/1950 | H.E. |       | 1949             | o   | 14at           | 3250                                          | 24/27/32/<br>37/? 21/                 | Vorzeitige Placentala-<br>lösung.Starke Blutung;<br>Herztöne nicht hörbar;<br>Kindsteile nicht tast-<br>bar | Frühgeburt, unreif,<br>tot geboren | 27                                             |
|         |           |      |       | 1950             | S   | VII            | 1150                                          |                                       |                                                                                                             |                                    |                                                |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr                     | Art<br>dauer | Grav.                                            | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang- | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                                                                                  | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes                    |
|---------|----------|------|-------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 185     | 14/1951  | H.A. |       | 1940 o<br>1948 o<br>1951 S           | 32           | re 4000<br>re 3500<br>VII 1070 35/?              | 25/29/<br>31,5/21/<br>VII 1070 35/?            |                                       | Vorzeitige Placen-<br>taloösung, Blutung<br>ex utero; Thrombose<br>des li Beines. Apo-<br>plexia utero pla-<br>centaris. Sec. Anaemie                     |                                  | Unreifgeburt<br>Mens VII, Kind<br>starb nach 4 Std. |
| 186     | 641/1949 | L.R. |       | 1940 o<br>1949 S                     | 34           | re 4500<br>7pt 4050 52/37<br>10                  | 24,5/27,5<br>30/18,5/<br>10                    |                                       | Status nach Symphy-<br>senruptur. Nach Beur-<br>teilung von Prof.<br>Niederecker ist Ge-<br>burt per viam natu-<br>ral abzulehnen                         |                                  |                                                     |
| 187     | 338/1948 | S.B. |       | 1940 o<br>1948 S                     | 36           | 14pt 2630<br>re 3360 50/34<br>20/                | 25/27/31/<br>20/                               |                                       | Status nach Symphy-<br>senruptur. Steißlage<br>fest auf Becken auf-<br>sitzend. Um Symphyse<br>nicht wieder zu ver-<br>letzen, Entscheidung<br>zur Sectio |                                  |                                                     |
| 188     | 45/1951  | R.E. |       | 1944 o<br>1946 o<br>1947 o<br>1951 S | 28           | re 3900<br>re 4200<br>re 4020<br>12pt 3800 56/37 | 26/31/34/<br>21/<br>25/27,5/<br>30/18,5/<br>10 |                                       | Status nach Symphy-<br>sendehnung.<br>Übertragung                                                                                                         |                                  |                                                     |
| 189     | 469/1935 | S.I. |       | 1927 o<br>1929 o<br>1931 o<br>1935 S | 35           | re 3250<br>re 3250<br>re 3250<br>10at 3250 50/34 | 25/27,5/<br>30/18,5/<br>10                     |                                       | Status nach Interpo-<br>sitis; Tuberculosis<br>pulmonalis. Querlage.<br>insuffizienz                                                                      |                                  | Kreis-<br>lauf-<br>insuf-<br>fizienz                |
| 190     | 79/1927  | H.M. |       | 1922 o<br>1925 o<br>1926 o<br>1927 S | 29           | re 2250<br>re ?<br>re ?<br>14at 3000 52/33       | 23/26/33<br>19,5/<br>10                        |                                       | Narbenstricture der<br>Vagina nach Sturz-<br>geburt. Verschluss<br>des Muttermundes                                                                       |                                  |                                                     |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr                             | Art                          | Grav. Kind<br>dauer            | Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang  | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                                                                                              | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|----------|------|-------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 191     | 465/1952 | K.M. | 40    | 1950<br>1952                                 | Z<br>S                       | re<br>?                        | 3500<br>4000                           | 28/29/31/<br>19,5/                    | Relatives Mißv.<br>Vorzeitiger Blasen-<br>sprung; Geburtsstill-<br>stand                                                                                              |                                  |                                  |
| 192     | 347/1951 | R.J. |       | 1947<br>1949<br>1951                         | Z<br>o<br>S                  | re<br>re<br>re                 | 3920<br>3250<br>4620                   | 26,5/30/<br>33,5/21,5                 | Relatives Mißv.<br>Senr großes Kind                                                                                                                                   |                                  |                                  |
| 193     | 330/1949 | W.M. | 34    | 1939<br>1940<br>1949                         | Z<br>A<br>S                  | re<br>M.?<br>21pt              | 4750<br>--<br>4700                     | 24/28/31/<br>20/<br>57/37,5           | Relatives Mißv.<br>Letzte Geburt vor<br>10 Jahren.<br>Großes Kind                                                                                                     |                                  |                                  |
| 194     | 269/1947 | S.R. |       | 1931<br>1941<br>1941<br>1942<br>1943<br>1947 | o<br>F+<br>F+<br>o<br>o<br>S | re<br>?<br>?<br>re<br>re<br>re | 3020<br>?<br>?<br>2070<br>2100<br>3780 | 27,5/29/<br>32,5/20,5                 | Relatives Mißv.<br>1941: Gemini<br>Vergebliche Zangen-<br>versuche außerhalb<br>der Klinik. Um Asepsis<br>zu wahren, wird der<br>nicht aseptische<br>Uterus amputiert |                                  |                                  |
| 195     | 5/1950   | F.I. | 24    | 1948<br>1950                                 | Z+<br>S                      | 9at<br>3pt                     | 4000<br>4100                           | 25/28/33/<br>20/<br>52/36             | Relatives Mißv.<br>Vorzeitiger Blasen-<br>sprung                                                                                                                      |                                  |                                  |
| 196     | 452/1952 | S.A. |       | 1946<br>1947<br>1949<br>1952                 | o<br>o<br>o<br>S             | re<br>re<br>re<br>re           | 4000<br>3500<br>3750<br>4500           | 27/30/33/<br>21/<br>57/36,5           | Relatives Mißv.<br>Placenta praevia<br>marg. Sehr großes Kind;<br>drohende Uterusruptur.                                                                              |                                  |                                  |
| 197     | 242/1952 | W.E. | 36    | 1942<br>1945<br>1951<br>1952                 | A<br>o<br>A<br>S             | M. III<br>re<br>M. IV<br>re    | III<br>3500<br>--<br>4000              | 24/27/30<br>20/<br>54/36              | Relatives Mißv.<br>Vorzeitiger Blasen-<br>sprung; Kopf auf Becken-<br>eingang fest aufge-<br>preßt. Fruchtwasser<br>mekoniumhaltig                                    |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr.  | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav. | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                                                                                       | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|-----------|------|-------|------------------|-----|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 198     | 1217/1949 | D.L. | 23    | 1948             | o   | re    | 3125                                          | 24,5/27/<br>30,5/19/                  | Relatives Mißv.<br>Schwankende Herztöne                                                                                                                        |                                  |                                  |
| 199     | 219/1942  | S.L. |       | 1937             | A   | ?     | --                                            | 26/31/34/<br>21/                      | Relatives Mißv.<br>Oligohydramnie;<br>schwankende Herztöne                                                                                                     |                                  |                                  |
| 200     | 338/1934  | S.K. | 31    | 1933             | o   | re    | 3000                                          | 28/30/34/<br>21/                      | Relatives Mißv.<br>Abgewichene Steißlage;<br>absinkende Herztöne                                                                                               |                                  |                                  |
| 201     | 107/1933  | S.F. | 36    | 1922             | o   | re    | 3700                                          | 31/33/38/<br>?/?/                     | Relatives Mißv.<br>Naegeli'-Obliquität;<br>Praeeklampsie; freie<br>Herztöne                                                                                    |                                  |                                  |
| 202     | 592/1925  | M.B. |       | 1920             | o   | re    | 3250                                          | 26,5/29,5<br>31/19/                   | Relatives Mißv.<br>Sehr großer Kopf;<br>abgewichen. Placenta<br>praevia lateralis                                                                              |                                  |                                  |
| 203     | 29/1932   | G.T. |       | 1922             | o   | re    | 4000                                          | 26/30/34/<br>20/                      | Relatives Mißv.<br>Großes Kind; schwanken-<br>de Herztöne, bei engem<br>Muttermund; vorzeitiger<br>Blasensprung; Cyste im<br>freien Teil der Tuben-<br>ampulle |                                  |                                  |
| 204     | 690/1943  | B.O. | 28    | 1941             | Z   | re    | 4080                                          | 29/30/<br>33/21,5                     | Nabelschnurvorfall<br>bei vollkommener Fuß-<br>lage; Reiten des Kin-<br>des auf der Nabel-<br>schnur. Absinkende<br>Herztöne.                                  |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr.  | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav.<br>dauer | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                         | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|-----------|------|-------|------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 205     | 236/1943  | P.A. |       | 1934             | o   | re             | 3200                                          | 25/28/<br>30/21                       | Nabelschnurvorfall.<br>Schwankende Herz-<br>töne                                                 |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1936             | o   | re             | 3300                                          |                                       |                                                                                                  |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1940             | o   | re             | 3200                                          |                                       |                                                                                                  |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1943             | s   | re             | 3360                                          | 50/37                                 |                                                                                                  |                                  |                                  |
| 206     | 1561/1939 | S.E. |       | 1935             | Z   | re             | 2250                                          | 26/27,5/<br>30,5/19/<br>9             | Nabelschnurvorfall.<br>Absinkende Herzöne.<br>Mekoniumhaltiges<br>Fruchtwasser                   |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1937             | A   | II             | --                                            |                                       |                                                                                                  |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1939             | S   | 8pt            | 3150                                          | 52/34                                 |                                                                                                  |                                  |                                  |
| 207     | 1052/1938 | H.R. |       | 1937             | o   | re             | 4000                                          | 26/28/<br>32,5/?                      | Nabelschnurvorfall.<br>Absinkende Herzöne                                                        |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1938             | S   | re             | 3280                                          | 52/36                                 |                                                                                                  |                                  |                                  |
| 208     | 98/1936   | S.N. |       | 1934             | A   | II             | --                                            | 28,5/31,5<br>33/20/                   | Nabelschnurvorfall.<br>Absinkende Herzöne.<br>Uterus arcuatus                                    |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1935             | o+  | re             | 3500                                          |                                       |                                                                                                  |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1935             | A   | III            | --                                            |                                       |                                                                                                  |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1936             | A   | III            | --                                            |                                       |                                                                                                  |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1936             | S   | re             | 3190                                          | 50/35                                 |                                                                                                  |                                  |                                  |
| 209     | 2/1934    | H.E. |       | 1930             | o   | re             | 3500                                          | 26/30/<br>32/20                       | Nabelschnurvorfall.<br>Schlechte Herzöne.<br>Vorzeitiger Blasen-<br>sprung                       |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1932             | o   | re             | 3750                                          |                                       |                                                                                                  |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1934             | S   | 16pt           | 3370                                          | 54/36                                 |                                                                                                  |                                  |                                  |
| 210     | 7/1925    | S.L. |       | 1905             | o   | re             | 5000                                          | 26/23/<br>2/?                         | Nabelschnurvorfall.<br>Vorzeitiger Blasen-<br>sprung                                             |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1906             | o   | re             | 3750                                          |                                       |                                                                                                  |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1925             | S   | 10pt           | 3200                                          | 51/34,5                               |                                                                                                  |                                  |                                  |
| 211     | 137/1934  | V.M. |       | 1927             | o   | pt             | ?                                             | 28/30,5/<br>31/19/<br>34,5            | Nabelschnur doppelt<br>und fest um den Hals<br>geschlungen. Absin-<br>kende Herzöne              |                                  |                                  |
|         |           |      |       | ?                | A   | I              | --                                            |                                       |                                                                                                  |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1934             | S   | 14at           | 3050                                          | 53/34,5                               |                                                                                                  |                                  |                                  |
| 212     | 651/1946  | S.W. |       | 1946             | o+  | re             | 5500                                          | 25,5/29/<br>30,5/19,5                 | In Anbetracht der<br>Totgeburten und hohem<br>Alter der Patientin<br>wird Sectio ausge-<br>führt |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1927             | F   | VII            | 1750                                          |                                       |                                                                                                  |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1930             | A   | IV             | --                                            |                                       |                                                                                                  |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1930             | o+  | 14pt           | 52/50                                         |                                       |                                                                                                  |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1937             | o+  | re             | 5250                                          |                                       |                                                                                                  |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1944             | S   | 3 pt           | 4380                                          | 56/38                                 |                                                                                                  |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav. | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf- | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                                               | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter                                                          | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|----------|------|-------|------------------|-----|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 213     | 269/1944 | K.D. |       | 1938             | o+  | re    | 3500                                | 27,5/30/<br>34/23/<br>ex/vera         | Habituelle Totge-<br>burten. Frequente<br>Herztöne                                                                     | Struma cong.atelekt.<br>Lungen, Kind starb<br>n. 4 Std.                                   |                                  |
| 214     | 569/1927 | U.L. | 29    | 1944             | S+  | 28at  | 2600                                | 50/34                                 | Habituelle Tot-<br>geburten                                                                                            | Herzinsuffi-<br>zienz                                                                     |                                  |
|         |          |      |       | 1920             | o+  | re    | 3000                                | 25/28/31/<br>19,5/                    |                                                                                                                        |                                                                                           |                                  |
|         |          |      |       | 1922             | o   | re    | ?                                   |                                       |                                                                                                                        |                                                                                           |                                  |
|         |          |      |       | 1924             | o+  | re    | ?                                   |                                       |                                                                                                                        |                                                                                           |                                  |
| 35      |          |      |       | 1927             | S   | re    | 2350                                | 50/33                                 |                                                                                                                        |                                                                                           |                                  |
| 215     | 36/1952  | K.E. |       | 1945             | o   | re    | 3600                                | 26/30/32/<br>20,5/                    | Status nach Tot-<br>geburten                                                                                           |                                                                                           |                                  |
|         |          |      |       | 1946             | o+  | 28at  | 3500                                |                                       |                                                                                                                        |                                                                                           |                                  |
|         |          |      |       | 1949             | o+  | 14at  | 2650                                |                                       |                                                                                                                        |                                                                                           |                                  |
| 29      |          |      |       | 1952             | S   | 5at   | 3460                                | 53/34                                 |                                                                                                                        |                                                                                           |                                  |
| 216     | 58/1949  | W.O. |       | 1942             | Z+  | re    | 3000                                | 23,5/27,5/<br>32,5/20/                | Status nach 2 Tot-<br>geburten und lang-<br>dauernder letzter<br>Geburt(15,5 Std.)                                     |                                                                                           |                                  |
|         |          |      |       | 1943             | o   | re    | 3030                                |                                       |                                                                                                                        |                                                                                           |                                  |
|         |          |      |       | 1947             | o+  | re    | 3500                                |                                       |                                                                                                                        |                                                                                           |                                  |
| 32      |          |      |       | 1949             | S   | 14at  | 2900                                | 50/34,5                               |                                                                                                                        |                                                                                           |                                  |
| 217     | 28/1934  | W.B. | 32    | 1929             | o   | re    | 4000                                | 25/28/31/<br>25/20/                   | Schlechte Herztöne.<br>Vorzeitiger Blasen-<br>sprung,Rasche<br>Wehenfolge                                              |                                                                                           |                                  |
|         |          |      |       | 1934             | S   | re    | 4320                                | 54/35                                 |                                                                                                                        |                                                                                           |                                  |
| 218     | 40/1934  | B.I. |       | 1926             | o+  | re    | ?                                   | 29/33/35/<br>23/                      | Hobe unregelmäßige<br>Herztöne.Gefährde-<br>tes Kind bei engen<br>Mütermünd                                            |                                                                                           |                                  |
|         |          |      |       | 1927             | o   | re    | 6000                                |                                       |                                                                                                                        |                                                                                           |                                  |
|         |          |      |       | 1929             | o   | re    | 3750                                |                                       |                                                                                                                        |                                                                                           |                                  |
| 36      |          |      |       | 1934             | S   | 21pt  | 2640                                | 50/32                                 |                                                                                                                        |                                                                                           |                                  |
| 219     | 3/1933   | Z.P. | 36    | 1925             | o   | re    | 3200                                | 27/30/33/<br>21,5/                    | Schwankende Herztöne<br>Hoher Gradstand                                                                                |                                                                                           |                                  |
|         |          |      |       | 1932             | S   | 6at   | 3200                                | 53/35                                 |                                                                                                                        |                                                                                           |                                  |
| 31      |          |      |       | 1909             | o   | 14at  | ?                                   | 23/26/32/<br>19/                      | Schwankende Herztöne.<br>Vorzeitiger Blasen-<br>sprung.Mekoniumabgang.<br>Gefährdetes Kind in<br>der Eröffnungsperiode | Das Kind<br>starb 8 Std.<br>post partum.<br>Es liegt<br>kein Obduk-<br>tionsbefund<br>vor |                                  |
| 220     | 32/1928  | E.T. | 45    | 1919             | o   | re    | ?                                   |                                       |                                                                                                                        |                                                                                           |                                  |
|         |          |      |       | 1921             | o   | re    | ?                                   |                                       |                                                                                                                        |                                                                                           |                                  |
|         |          |      |       | 1928             | S   | 18at  | 2600                                | 49/33                                 |                                                                                                                        |                                                                                           |                                  |

| Lfd.Nr.                                  | Krbl.Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav. dauer | Kind<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                                                       | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|------------------------------------------|----------|------|-------|------------------|-----|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 221                                      | 90/1952  | B.M. | 35    | 1942             | Z   | re          | 2500                              | 28/31/30/                             | Zweimalige erfolg-<br>lose medicamentöse<br>Einleitung, Alte II.<br>para. Mens. & Verlang-<br>samte, arrhythmische<br>Herztöne |                                  |                                  |
| 221                                      | 90/1952  | B.M. | 35    | 1952             | S   | X           | 3270                              | 51/35 21/                             |                                                                                                                                |                                  |                                  |
| <b>II. Fälle mit wiederholter Sectio</b> |          |      |       |                  |     |             |                                   |                                       |                                                                                                                                |                                  |                                  |
| 222                                      | 355/1946 | H.A. |       | 1940             | Z+  | re          | ?                                 | 29/29/33/                             | EB II.° Plattrachi-<br>tisches Becken.                                                                                         |                                  |                                  |
|                                          |          |      |       | 1942             | Z   | re          | 3000                              | 19/8,3                                | 1943: EB.                                                                                                                      |                                  |                                  |
|                                          |          |      |       | 1943             | S   | 14pt        | 3000                              | ?                                     | 1945: EB.                                                                                                                      |                                  |                                  |
|                                          |          |      |       | 1945             | S   | re          | 4480                              | 57/37                                 | 1946: EB.                                                                                                                      |                                  |                                  |
|                                          |          |      |       | 1946             | S   | 5at         | 3100                              | 49/36                                 |                                                                                                                                |                                  |                                  |
| 223                                      | 890/1936 | D.E. |       | 1929             | 0+  | re          | 3000                              | 25,5/27,5/                            | EB II.°                                                                                                                        |                                  |                                  |
|                                          |          |      |       | 1932             | A   | III         | --                                | 29,5/18,5                             | 1933: EB. Vorzeitiger<br>Blasensprung.                                                                                         |                                  |                                  |
|                                          |          |      |       | 1933             | S   | re          | 3220                              | 50/34 8,3                             | 1936: EB. Status nach<br>Sectio.                                                                                               |                                  |                                  |
|                                          |          |      |       | 1936             | S   | 14at        | 3130                              | 52/34                                 |                                                                                                                                |                                  |                                  |
| 224                                      | 587/1929 | F.G. |       | 1920             | 0   | re          | 2250                              | 25/26,5/                              | EB II.°                                                                                                                        |                                  |                                  |
|                                          |          |      |       | 1925             | S   | re          | 3340                              | 32,5/16,5                             | 1925: EB.                                                                                                                      |                                  |                                  |
|                                          |          |      |       | 1929             | S   | re          | 3280                              | 7,8                                   | 1929: EB. Ovarialcyste                                                                                                         |                                  |                                  |
| 225                                      | 392/1929 | K.V. |       | 1925             | Z+  | re          | ?                                 | 30/32/                                | EB II.°                                                                                                                        |                                  |                                  |
|                                          |          |      |       | 1925             | S   | re          | 2950                              | 25,5/17/                              | 1925: EB.                                                                                                                      |                                  |                                  |
|                                          |          |      |       | 1929             | S   | 14at        | 3000                              | 51/37 7,8                             | 1929: EB. Status nach<br>Sectio                                                                                                |                                  |                                  |
| 226                                      | 521/1926 | H.R. |       | 1920             | Z   | re          | 2500                              | 26,5/27,5/                            | EB II.°                                                                                                                        |                                  |                                  |
|                                          |          |      |       | 1922             | Z   | re          | 2500                              | 29/16/8                               | 1923: EB.                                                                                                                      |                                  |                                  |
|                                          |          |      |       | 1923             | S   | re          | 2600                              | ?                                     | 1926: EB.                                                                                                                      |                                  |                                  |
|                                          |          |      |       | 1926             | S   | 14at        | 3000                              | 52/36                                 |                                                                                                                                |                                  |                                  |
| 227                                      | 215/1925 | L.E. |       | 1921             | 0+  | re          | 2500                              | 26,5/27,5                             | EB II.°                                                                                                                        |                                  |                                  |
|                                          |          |      |       | 1922             | S   | re          | 3000                              | 30,5/17,5                             | 1922: EB.                                                                                                                      |                                  |                                  |
|                                          |          |      |       | 1923             | S   | re          | 3250                              | ?                                     | 1923: EB.                                                                                                                      |                                  |                                  |
|                                          |          |      |       | 1925             | S   | 5at         | 3150                              | 53/34                                 | 1925: EB.                                                                                                                      |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav. | Kind<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang                                                     | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                                                     | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|----------|------|-------|------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 228     | 301/1942 | S.E. |       | 1939             | o+  |       | re 3250 ausw.<br>re 3550 54/34<br>14pt 3700 55/38                                     | 24,5/27,5<br>29,5/17,5<br>7,5         | EB III. o<br>1940: Wehenschwäche<br>1942: Querlage                                                                           |                                  |                                  |
| 229     | 131/1931 | F.A. |       | 1922             | Z   |       | re 3500 ausw.<br>re 3250 ?/?<br>re 3650 ?/?<br>re 3250 51/35                          | 23/26/29/<br>17,5/6,6<br>2/?<br>2/?   | EB III. o<br>1924: EB.<br>1926: EB.<br>1931: EB.                                                                             |                                  |                                  |
| 230     | 133/1942 | S.A. |       | 1939             | o   |       | re 2430 ausw.<br>re 3780 53/36<br>6at 3880 52/37                                      | 25,5/27,5<br>30,5/18/<br>7,1          | EB. III. o<br>1940: EB.<br>1942: Status nach<br>Sectio. Misv.                                                                |                                  |                                  |
| 231     | 210/1941 | B.M. |       | 1932             | o   |       | re 3250 ausw.<br>re 3500 " IV                                                         | 27/29/32/<br>19,5/7,1                 | EB III. o<br>1940: EB.<br>1941: Querlage                                                                                     |                                  |                                  |
| 232     | 172/1933 | F.E. |       | 1930             | o+  |       | re 2960 50/33,5<br>21pt 3060 52/33<br>re 3250 ausw.<br>VIII 3000 ?/?<br>re 3850 54/37 | 26/26,5/<br>30/17,5/<br>7,0           | EB III. o<br>1931: Placenta praevia<br>1933: EB.                                                                             |                                  |                                  |
| 233     | 622/1950 | R.A. |       | 1944             | o   |       | re 2500<br>re 4000 Perf.<br>re 3530 54/35<br>re 3710 52/36                            | 26/29/32/<br>19/<br>54/35<br>52/36    | EB I. o<br>1949: Status nach totem<br>Kind wegen Hängenblei-<br>ben des Kopfes bei<br>Steilblage.<br>1950: Abgewichenen Kopf |                                  |                                  |
| 234     | 439/1944 | S.M. |       | 1930             | Z   |       | re 3500<br>re 4000<br>re 3750 55/37,5<br>56pt 3380 51/37                              | 24/27/30/<br>19,5/<br>55/37,5         | EB I. o<br>1940: Naeglele'-Obliqui-<br>tät. Hydramnion.<br>1944: Litzmann'-Obli-<br>quität                                   |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr.  | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art  | Grav.<br>dauer | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Korff-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                         | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter                                    | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|-----------|------|-------|------------------|------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 235     | 145/1937  | B.K. |       | 1928 A           | II   | --             | --                                             | 21,5/27/30,18,5/8,2                   | EB I. o                                          |                                                                     |                                  |
|         |           |      |       | 1929 o           | re   | 4750           | 9, A                                           |                                       | 1935: Uterus arcuatus.                           |                                                                     |                                  |
|         |           |      |       | 1931 o           | re   | 3750           |                                                |                                       | Abgewichener Steiß.                              |                                                                     |                                  |
|         |           |      |       | 1934 A           | V    | --             |                                                |                                       | 1937: Uterus arcuatus.                           |                                                                     |                                  |
| 37      |           |      |       | 1935 S           | re   | 3830           | 56/37                                          |                                       | Großes Kind; Steißlage                           |                                                                     |                                  |
| 39      |           |      |       | 1937 S           | ?    | 4850           | 58/39,5                                        |                                       | Frühzeitiger Blasen-<br>sprung                   |                                                                     |                                  |
| 236     | 648/1943  | S.D. |       | 1927 o           | re   | 3200           |                                                |                                       | EB II. o                                         |                                                                     |                                  |
|         |           |      |       | 1928 o           | re   | 3000           |                                                |                                       | 1938: Litzmann'-Obli-<br>quität.                 |                                                                     |                                  |
|         |           |      |       | 1934 o+          | re   | 3700           |                                                |                                       | 1940: Hoher Gradstand.                           |                                                                     |                                  |
|         |           |      |       | 1937 o+          | re   | 3000           |                                                |                                       | 1943: Hoher Gradstand.                           |                                                                     |                                  |
| 37      |           |      |       | 1938 S           | re   | 4050           | 53/36                                          |                                       | Status nach Sectio.                              |                                                                     |                                  |
| 39      |           |      |       | 1940 S           | re   | 3800           | 54/34                                          |                                       |                                                  |                                                                     |                                  |
| 42      |           |      |       | 1943 S           | l1pt | 2970           | 52/38                                          |                                       |                                                  |                                                                     |                                  |
| 237     | 350/1937  | W.A. |       | 1929 Z           | re   | 2500           |                                                | 28/28/31/19,5/8                       | EB II. o                                         |                                                                     |                                  |
|         |           |      |       | 1931 Z           | re   | 2750           |                                                |                                       | 1935: Abgewichener Kopf.                         |                                                                     |                                  |
|         |           |      |       | 1933 o+          | re   | 3000           |                                                |                                       | 1937: Litzmann'-Obliqui-<br>tät                  |                                                                     |                                  |
| 36      |           |      |       | 1935 S           | l0pt | 4650           | 56/?                                           |                                       |                                                  |                                                                     |                                  |
| 38      |           |      |       | 1937 S           | l2pt | 3880           | 52/36,5                                        |                                       |                                                  |                                                                     |                                  |
| 238     | 1045/1937 | O.B. |       | 1924 o           | re   | ?              |                                                | 27/30/35/21/8                         | EB II. o                                         |                                                                     |                                  |
|         |           |      |       | 1925 o           | re   | 3250           |                                                |                                       | 1929: EB.                                        |                                                                     |                                  |
| 27      |           |      |       | 1929 S           | re   | 3500           | ??                                             |                                       | 1937: EB. Status nach<br>Sectio. Querlage        |                                                                     |                                  |
| 35      |           |      |       | 1937 S           | l9at | 3400           | 52/35                                          |                                       |                                                  |                                                                     |                                  |
| 239     | 281/1951  | M.A. |       | 1938 o           | re   | 4160           |                                                | 27/29,5/31,5/19,5                     | EB II. o                                         |                                                                     |                                  |
| 25      |           |      |       | 1939 S           | re   | 3420           | 52/36                                          |                                       | 1939: Placenta praevia<br>marg.                  | Frühgeburt<br>Kind starb nach<br>2 3/4 Stdn.                        |                                  |
| 29      |           |      |       | 1943 S           | re   | 3910           | 54/37 8,7                                      |                                       | 1943: Litzmann'-Obliqui-<br>tät.                 |                                                                     |                                  |
| 1948 A  |           |      |       | 1948 A           | V    | --             |                                                |                                       | 1951: Placenta praevia<br>marg.                  |                                                                     |                                  |
| 37      |           |      |       | 1951 S           | IX   | 1970           | 45/31                                          |                                       |                                                  |                                                                     |                                  |
| 240     | 349/1943  | W.M. |       | 1930 A           | II   | --             |                                                | 26,5/29,5/31/19,5/8,7                 | EB II. o                                         |                                                                     |                                  |
|         |           |      |       | 1932 o+          | re   | 4000           |                                                |                                       | 1934: Status nach Myomen-<br>creation. Querlage. | Frühgeburt<br>ausgediente Ate-<br>lektasen. Kind<br>starb n. 4 Std. |                                  |
| 29      |           |      |       | 1934 S           | re   | 3650           | 54/36                                          |                                       | 1936: Querlage.                                  |                                                                     |                                  |
| 31      |           |      |       | 1936 S           | re   | 3410           | 51/36                                          |                                       |                                                  |                                                                     |                                  |
| 1938 A  |           |      |       | 1938 A           | II   | --             |                                                |                                       | 1943: Placenta praevia.                          |                                                                     |                                  |
| 38      |           |      |       | 1943 S+          | 35at | 1700           | 44/?                                           |                                       |                                                  |                                                                     |                                  |

| Lfd.Nr. | Krönl.Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | dauer | Grav. | Kind<br>Gewicht/<br>Kopf-<br>Größe/<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                               | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|-----------|------|-------|------------------|-----|-------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 241     | 690/1936  | N.A. |       | 1930             | Z   |       | re    | 3400                                          | 25/29/30/<br>20,5/8,3                 | EB II.0                                                |                                  |                                  |
| 22      |           |      |       | 1934             | S   |       | re    | 3050                                          | 52/35                                 | 1934: Status post<br>Laesionem vaginae.                |                                  |                                  |
| 23      |           |      |       | 1935             | S   |       | re    | 3350                                          | 52/35                                 | 1935: Wechselnde<br>Kindslegen; Status<br>nach Sectio. |                                  |                                  |
| 24      |           |      |       | 1936             | S   |       | re    | 3120                                          | 50/36                                 | 1936: Status nach<br>2. Sectiones. EB                  |                                  |                                  |
| 242     | 648/1927  | H.R. |       | 1923             | O   |       | re    | 3500                                          | 26/28/30/<br>?                        | 1925: Placenta praevia<br>lateralis.                   |                                  |                                  |
| 31      |           |      |       | 1925             | S   |       | VIII  | 1900                                          | 48/30                                 | 1927: Uterusruptur                                     |                                  |                                  |
| 33      |           |      |       | 1927             | S   |       | X     | 3050                                          | 52/35                                 | 1949: Placenta praevia.                                |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1936             | O   |       | ?     | 3250                                          | 23,5/29/<br>32/21                     | 1952: Status nach<br>Sectio und<br>Myomenucleation     |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1937             | O   |       | ?     | 4250                                          |                                       |                                                        |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1947             | A   |       | V     | --                                            |                                       |                                                        |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1948             | A   |       | VI    | --                                            |                                       |                                                        |                                  |                                  |
| 39      |           |      |       | 1949             | S   |       | ?     | 3850                                          | 53/37                                 |                                                        |                                  |                                  |
| 40      |           |      |       | 1950             | S   |       | ?     | 4000                                          | 53/37                                 |                                                        |                                  |                                  |
| 244     | 1283/1951 | K.V. |       | 1935             | O   |       | re    | 3500                                          | 26/28/32/<br>20/8                     | EB II.0                                                |                                  |                                  |
| 33      |           |      |       | 1937             | O+  |       | 14pt  | 4000                                          |                                       | 1942: Kopf tritt nicht<br>ins Becken.                  |                                  |                                  |
| 42      |           |      |       | 1942             | S   |       | re    | 3400                                          | 52/36                                 | 1951: Mißverhältnis                                    |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1951             | S   |       | re    | 3500                                          | 49/34                                 | EB II.0                                                |                                  |                                  |
| 245     | 554/1933  | B.M. |       | 1924             | O+  |       | re    | 2250                                          | 23,5/27/<br>30,5/19/<br>8,7           | 1930: 3 frustane<br>Geburten.                          |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1926             | O+  |       | re    | ?                                             |                                       | 1932: Status n. Sectio.                                |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1928             | O+  |       | re    | 2800                                          |                                       | 1933: Status n. Sectio.                                |                                  |                                  |
| 32      |           |      |       | 1930             | S   |       | 17at  | 3500                                          | 52/35                                 |                                                        |                                  |                                  |
| 34      |           |      |       | 1932             | S   |       | 24pt  | 3200                                          | 52/36                                 |                                                        |                                  |                                  |
| 35      |           |      |       | 1933             | S   |       | 8pt   | 3350                                          | 53/36                                 |                                                        |                                  |                                  |
| 246     | 86/1931   | R.K. |       | 1922             | Z   |       | re    | ?                                             | 25/27/29/<br>16,5/8,3                 | EB II.0                                                |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1925             | Z   |       | re    | 3750                                          |                                       | 1929: Großes Kind.                                     |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1927             | O   |       | re    | 4250                                          |                                       | 1931: Kopf prominent<br>auffallend stark.              |                                  |                                  |
| 30      |           |      |       | 1929             | S   |       | 21pt  | 4050                                          | 54/38                                 | Mißv.                                                  |                                  |                                  |
| 32      |           |      |       | 1931             | S   |       | 8at   | 3300                                          | 53/35                                 |                                                        |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr.  | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav. | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                                                                                                                                                                                                                       | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|-----------|------|-------|------------------|-----|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 247     | 45/1929   | S.K. |       | 1924             | Z   | re    | 4000                                          | 26/28/30/<br>17,5/8,7                 | EB II.0<br>1928: Placenta Praevia.<br>Großes Kind.                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1926             | O   | re    | 2900                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1928             | S   | re    | 3850                                          | 55/36,5                               | 1929: Status nach Sectio.<br>Mißv.                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1929             | S   | 9pt   | 3300                                          | 53/36                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
| 248     | 1084/1952 | K.F. |       | 1948             | Z   | re    | 2950                                          | 27/30/<br>31,5/20,5                   | Trichterbecken.<br>1949: Sehr großer Kopf.<br>1952: Mißverhältnis.                                                                                                                                                                                             |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1949             | S   | 8pt   | 4060                                          | 54/39                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1952             | S   | 12pt  | 4050                                          | 53/36                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
| 249     | 1060/1951 | M.J. |       | 1942             | Z   | re    | 2980                                          | 26/28/31<br>20/                       | Relatives Mißverhältnis.<br>1947: Großes Kind.<br>Arrhythmische Herztöne.<br>Geburtsstillstand.<br>1951: Toxicose; Hyper-<br>tonie. Mißv. gr. Kind                                                                                                             |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1944             | O   | re    | 3660                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1947             | S   | re    | 3850                                          | 53/39                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1951             | S   | re    | 3840                                          | 52/40                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
| 250     | 203/1941  | S.M. |       | 1930             | O   | re    | 2750                                          | 23,5/27,5/<br>30/18,5/<br>7,9         | EB II.0<br>1939: Steißlage.<br>1941: Status post<br>sectionem.<br>1. Kind durch Geb.-trauma<br>geistesschwach. 2. Kd.<br>gest. nach 6 Mon. Nur<br>3. Kd., das durch Sectio<br>entbunden, lebt und ist<br>gesund. - Dringender<br>Wunsch nach lebendem<br>Kind. |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1932             | A   | III   | --                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1933             | A   | III   | --                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1935             | O   | re    | ?                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1936             | A   | III   | --                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1937             | A   | III   | --                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1939             | S   | re    | 3680                                          | 56/36                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1941             | S   | 12pt  | 3300                                          | 53/36                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
| 251     | 45/1940   | P.L. |       | 1924             | Z   | re    | 2500                                          | 25,5/27/<br>29,5/18,5                 | EB I.0<br>1937: Absinkende Herztöne.<br>1940: Nabelschnurkompressi-<br>onen. Adhäsionen.                                                                                                                                                                       |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1937             | S   | re    | 3250                                          | 52/37                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1940             | S   | ?     | 2660                                          | 49/32                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr. | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art   | Grav. | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                            | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|----------|------|-------|------------------|-------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 252     | 496/1948 | H.J. |       | 1934             | Z     | re    | 5000                                          | 24/27/30/<br>20/9,8                   | EB I.0                                              |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1935             | Z     | re    | 3250                                          |                                       | 1940:Frühzeitiger<br>Blasensprung.                  |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1937             | Z     | re    | 3500                                          |                                       | Mekoniumabgang.MiBv.                                |                                  |                                  |
| 37      | 1940 S   |      |       | 1940             | S     | 5pt   | 3720                                          | 51/35,5                               | 1948:Schlechte Herz-<br>töne.Status post<br>sectio. |                                  |                                  |
| 45      | 1948 S   |      |       | 1948             | S     | re    | 3660                                          | 52/36,5                               |                                                     |                                  |                                  |
| 253     | 576/1946 | P.M. |       | 1931             | o     | re    | 2500                                          | 25/26/29/<br>18/8                     | EB II.0                                             |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1933             | o     | re    | 3400                                          |                                       | 1937:Schlechte Herztöne.                            |                                  |                                  |
| 29      |          |      |       | 1937             | S     | re    | 3400                                          | 51/35                                 | 1946:Vorzeit.Blasen-<br>sprung. MiBv.               |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1939             | A     | V     | ---                                           |                                       |                                                     |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1944             | o     | re    | 3230                                          |                                       |                                                     |                                  |                                  |
| 38      |          |      |       | 1946             | S     | 10at  | 3580                                          | 54/36                                 |                                                     |                                  |                                  |
| 254     | 620/1938 | S.A. |       | 1922             | Z     | re    | 4500                                          | 24/26,5/<br>30,5/19,5                 | EB II.0                                             |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1925             | Z     | re    | 4000                                          |                                       | 1932:Hydrannion.MiBv.                               |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1927             | o+    | re    | ?                                             | 8,5                                   | 1938:Wechselnde Herzt.<br>Status nach Sectio.       |                                  |                                  |
| 34      | 1932 S   |      |       | 1929             | o+    | re    | ?                                             |                                       |                                                     |                                  |                                  |
| 40      |          |      |       | 1932             | S     | re    | 4000                                          | 54/36                                 |                                                     |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1938             | S     | re    | 3750                                          | 53/35,5                               |                                                     |                                  |                                  |
| 255     | 455/1934 | S.A. |       | 1930             | o     | 12at  | 2700                                          | 24,5/25/<br>30,5/19/<br>7,8           | EB II.0                                             |                                  |                                  |
| 23      | 1932 S   |      |       | 1932             | S     | 14at  | 3000                                          | 50/35                                 | 1932:Nabelschn.vorf.Ansteig.HT                      |                                  |                                  |
| 25      | 1934 S   |      |       | 1934             | S     | 6pt   | 3350                                          | 52/36                                 | 1934:Status nach Sectio.<br>MiBv.                   |                                  |                                  |
| 256     | 736/1931 | S.H. |       | 1923             | o+    | re    | 4000                                          | 26/27/30/<br>19/8,9                   | EB II.0                                             |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1925             | o     | re    | 3200                                          |                                       | 1930:EB.Großes Kind.                                |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1926             | A     | V     | ---                                           |                                       | 1931:EB.Status nach Sectio.<br>Sinkende Herztöne.   |                                  |                                  |
|         |          |      |       | 1928             | Perf. | re    | 3600                                          |                                       |                                                     |                                  |                                  |
| 31      | 1930 S   |      |       | 1930             | S     | re    | 3650                                          | 53/36                                 |                                                     |                                  |                                  |
| 32      | 1931 S   |      |       | 1931             | S     | 8at   | 2600                                          | 50/33                                 |                                                     |                                  |                                  |
| 257     | 386/1934 | M.E. |       | 1930             | o+    | X     | 5000                                          | 25/27/29/<br>17,5/9,5                 | EB I.0                                              |                                  |                                  |
| 27      | 1932 S   |      |       | 1932             | S     | X     | 5150                                          | ??                                    | 1932:Geburtsstillstand bei<br>stürmischen Wehen.    |                                  |                                  |
| 29      | 1934 S   |      |       | 1934             | S     | X     | 5000                                          | 59/38                                 | 1934:Absinkende Herztöne.                           |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr. | Name | Alter          | Geburts-<br>Jahr                                     | Art                                 | Grav.                                    | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang        | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera                    | Indikation<br>zur Sectio                                                                                                                                | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|----------|------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 258     | 789/1944 | D.B. | 26<br>28       | 1940<br>1942<br>1944                                 | 0+<br>S                             | re<br>re                                 | ?<br>4150<br>3541                                    | 24/28/30/<br>29/9,2<br>51/38<br>51/35                    | EB II.°<br>1942: Absinkende<br>Herztöne.<br>1944: Geburtsstill-<br>stand                                                                                |                                  |                                  |
| 259     | 559/1943 | L.M. | 22<br>26       | 1935<br>1936<br>1937<br>1939<br>1942<br>1943         | 0+<br>0<br>Z+<br>S<br>0<br>S        | re<br>re<br>re<br>re<br>14at<br>4pt      | ?<br>3000<br>3250<br>3350<br>2900<br>3720            | 21,5/25/<br>29/18/9<br>50/33<br>53/38,5                  | EB II.°<br>1939: Status nach 3<br>toten Kindern. Das<br>2. Kd. starb nach 4<br>Wochen.<br>1943: Status nach Sectio;<br>frühzeit. Blasensprung.<br>Mißv. |                                  |                                  |
| 260     | 49/1941  | D.M. | 26<br>32<br>34 | 1930<br>1931<br>1933<br>1939<br>1941                 | 0+<br>0+<br>S<br>S<br>S             | re<br>re<br>re<br>re<br>re               | 4000<br>3500<br>2600<br>3280<br>3350                 | 24,5/25,5<br>30,5/17,5<br>7,8<br>50/31<br>51/34<br>52/34 | EB II.°<br>1933: 2 frustane<br>Geburten.<br>1939: Mißverhältnis.<br>1941: Mißverhältnis.                                                                |                                  |                                  |
| 261     | 94/1940  | H.L. | 36<br>38       | 1923<br>1926<br>1937<br>1938<br>1940                 | F+<br>0<br>0+<br>S<br>S             | VIII<br>re<br>re<br>re<br>re             | ?<br>3500<br>3500<br>3680<br>3000                    | 26/29/34/<br>18,5/9,2<br>52/37<br>50/36,5                | EB I.°<br>1938: EB. Status nach 2<br>toten Kindern.<br>1940: EB. Status post<br>sectionem Mißv.                                                         |                                  |                                  |
| 262     | 110/1934 | S.P. | 24<br>26       | 1931<br>1932<br>1934                                 | Z+<br>0+<br>S                       | re<br>re<br>re                           | 2350<br>2700<br>3300                                 | 25,5/29/<br>31/19/8,5<br>52/35                           | EB II.°<br>1932: 2 frustane<br>Geburten.<br>1934: Status nach Sectio.<br>Mißv.                                                                          |                                  |                                  |
| 263     | 337/1933 | H.R. | 37<br>39       | 1925<br>1926<br>1927<br>1928<br>1929<br>1931<br>1933 | 0+<br>0+<br>0+<br>0<br>0+<br>S<br>S | re<br>re<br>re<br>re<br>re<br>re<br>132t | 3000<br>2750<br>2500<br>2550<br>2650<br>3150<br>3400 | 26/27,5/<br>30,5/19,5<br>7,9<br>53/34<br>55/36           | EB II.°<br>1931: EB. Von 5 Kindern<br>lebt nur eines.<br>1933: Status nach Sectio.<br>Frequente Herztöne.                                               |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr.  | Name | Alter    | Geburts-<br>jahr                                     | Art                              | Grav.                                    | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang       | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera   | Indikation<br>zur Sectio                                                                                                              | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|-----------|------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 264     | 41/1938   | Z.M. |          | 1930                                                 | Z+                               | 7at                                      | 2600                                                | 25/28/31/<br>19/7,7                     | EB II.°<br>1934: Absinkende<br>Herztöne.<br>1938: Status nach<br>Sectio                                                               |                                  |                                  |
| 31      | 1934 S    |      |          |                                                      | S                                | re                                       | 3080                                                | 52/35                                   |                                                                                                                                       |                                  |                                  |
| 35      | 1938 S    |      |          |                                                      | S                                | 4pt                                      | 2200                                                | 48/32                                   |                                                                                                                                       |                                  |                                  |
| 265     | 1030/1949 | S.M. | 25<br>27 | 1946<br>1947<br>1949                                 | Z<br>S<br>S                      | re<br>re<br>6pt                          | 3000<br>3450<br>3720                                | 25/28/<br>29,5/18,5<br>51/35            | EB I.° Allg.verengt.Becken<br>1947: Mißverhältnis. Wehenschw.<br>1949: Vorzeitiger<br>Blasenprung; primäre<br>Wehenschwäche, Mißverh. |                                  |                                  |
| 266     | 294/1951  | B.M. |          | 1947<br>1948<br>1951                                 | O<br>S<br>S                      | re<br>14pt<br>re                         | 3500<br>2980<br>3100                                | 52/34<br>50/35                          | EB I.°<br>1948: #ehenschwäche.<br>Hängebauch, Mißverh.<br>1951: Hängebauch.<br>EB. Mißv.                                              |                                  |                                  |
| 267     | 733/1944  | R.R. |          | 1930<br>1932<br>1933<br>1935<br>1937<br>1939<br>1944 | O<br>A<br>Z<br>O<br>O+<br>S<br>S | re<br>V<br>re<br>re<br>re<br>11pt<br>8pt | 3500<br>---<br>3800<br>3500<br>1400<br>4180<br>3780 | 25/27/31/<br>19/9,5<br>55/37<br>50/37,5 | EB I.° Mißv.<br>1939: Hydramnion.<br>1944: Naegelle'-<br>Obliquität. Dring.<br>Wunsch n.leb. Kind;<br>4 Kinder vorher<br>gestorben    |                                  |                                  |
| 268     | 16/1949   | W.M. |          | 1939<br>1941<br>1949                                 | Z+<br>S<br>S                     | re<br>re<br>16at                         | 3350<br>3650<br>3200                                | 26/29/31/<br>21/9,4<br>51/34,5          | EB I.° Allg.verengt.Becken<br>1941: Litzmann'-<br>Obliquität.<br>1949: Status post<br>sectionem.<br>Mißv.                             |                                  |                                  |
| 269     | 226/1933  | O.A. | 40<br>42 | 1928<br>1931<br>1933                                 | Z+<br>S<br>S                     | re<br>2lat<br>8pt                        | 3750<br>3100<br>3640                                | 23/25/28/<br>17,5/8,4<br>53/34<br>51/36 | EB II.°<br>1931: Schwankende<br>Herztöne.<br>1933: Querlage. Status<br>nach Sectio, vorz. Blasprg.                                    |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr.  | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art   | Grav. | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indig-tion<br>zur Sectio                                                                       | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|-----------|------|-------|------------------|-------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 270     | 255/1951  | Z.G. | 26    | 1947             | o     | re    | 2750                                          | 24/27,5/<br>30/20/                    | 1949:relatives Mi.v.<br>1951:Placenta praevia<br>lat.Relat.MiBv.                               |                                  |                                  |
| 271     | 394/1951  | B.M. | 28    | 1949             | s     | re    | 3180                                          | 52/35                                 |                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      | 30    | 1951             | s     | re    | 3270                                          | 50/34                                 |                                                                                                |                                  |                                  |
| 272     | 1258/1950 | G.B. | 26    | 1944             | Z     | re    | 4500                                          | 23/26/30/<br>18,5/                    | EB I.o<br>1947:Sectio auswärts.<br>1951:Vorzeitiger<br>Blasensprung.                           |                                  |                                  |
| 273     | 320/1942  | D.R. | 30    | 1945             | A     | III   | --                                            |                                       |                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      | 30    | 1947             | S     | re    | 3750                                          |                                       |                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      | 30    | 1951             | S     | 8at   | 3930                                          | 54/36                                 | Status nach Sectio                                                                             |                                  |                                  |
| 274     | 504/1927  | S.K. | 28    | 1928             | F     | VII   | 1600                                          | 26/29/33/<br>19/                      | EB I.o<br>1934:Sectio auswärts.<br>1950:Primäre Wehen-<br>schwäche;vorzeitiger<br>Blasensprung |                                  |                                  |
| 275     | 1141/1938 | B.M. | 37    | 1931             | o     | re    | 4000                                          |                                       |                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      | 37    | 1933             | o     | re    | 3000                                          |                                       |                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      | 37    | 1934             | S     | re    | 2750                                          |                                       |                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      | 37    | 1936             | S     | re    | 2500                                          |                                       |                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      | 37    | 1937             | o     | re    | ?                                             |                                       |                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      | 37    | 1939             | o     | re    | ?                                             |                                       |                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      | 37    | 1940             | o     | re    | ?                                             |                                       |                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      | 37    | 1943             | o     | re    | ?                                             |                                       |                                                                                                |                                  |                                  |
|         |           |      | 37    | 1950             | S     | M. X  | 3650                                          | 53/38                                 |                                                                                                |                                  |                                  |
| 276     | 320/1942  | D.R. | 29    | 1935             | Z     | re    | 4000                                          | 27/28/32/<br>19/10,?                  | EB I.o<br>1940:Sectio auswärts.<br>1942:Status post sectionem                                  |                                  |                                  |
| 277     | 504/1927  | S.K. | 31    | 1940             | S     | re    | 3000                                          |                                       |                                                                                                |                                  |                                  |
| 278     | 504/1927  | S.K. | 31    | 1942             | S     | re    | 3750                                          | 54/37                                 |                                                                                                |                                  |                                  |
| 279     | 504/1927  | S.K. | 31    | 1921             | o+    | re    | ?                                             | 25,5/26,5<br>31/17,5/                 | EB II.o<br>1926:Sectio auswärts.<br>1927:EB. MiBv.                                             |                                  |                                  |
| 280     | 504/1927  | S.K. | 31    | 1925             | A     | III   | --                                            |                                       |                                                                                                |                                  |                                  |
| 281     | 504/1927  | S.K. | 31    | 1926             | S     | re    | 2700                                          | ??                                    |                                                                                                |                                  |                                  |
| 282     | 504/1927  | S.K. | 31    | 1927             | S     | X     | 3300                                          | 53/35                                 |                                                                                                |                                  |                                  |
| 283     | 504/1927  | S.K. | 31    | 1933             | o     | re    | 3500                                          |                                       |                                                                                                |                                  |                                  |
| 284     | 504/1927  | S.K. | 31    | 1934             | Perf. | pt    | ?                                             | 23/26/<br>28,5/20/<br>8,4             | EB II.o<br>1936:Sectio auswärts.<br>1938:Sinkende Herztöne                                     |                                  |                                  |
| 285     | 504/1927  | S.K. | 31    | 1936             | S     | 14at  | ?                                             | ??                                    |                                                                                                |                                  |                                  |
| 286     | 504/1927  | S.K. | 31    | 1937             | o     | 42at  | ?                                             | ??                                    |                                                                                                |                                  |                                  |
| 287     | 504/1927  | S.K. | 31    | 1938             | S     | re    | 3330                                          | 50/35                                 |                                                                                                |                                  |                                  |

| Lfd.Nr. | Krbl.Nr.  | Name | Alter | Geburts-<br>Jahr | Art | Grav. | Kind<br>Gewicht/<br>Größe/<br>Kopf-<br>umfang | Becken-<br>maße<br>sp/c/t/<br>ex/vera | Indikation<br>zur Sectio                                          | Todes-<br>ursachen<br>der Mutter | Todes-<br>ursachen<br>des Kindes |
|---------|-----------|------|-------|------------------|-----|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 276     | 1021/1937 | H.E. |       | 1923             | A   | V     | --                                            | 24,5/30/<br>33/18,5/<br>8,8           | EB II.0                                                           |                                  |                                  |
|         |           |      | 29    | 1924             | Z+  | re    | 3350                                          |                                       | 1930:EB Mißv.                                                     |                                  |                                  |
|         |           |      | 35    | 1930             | S   | re    | 3350                                          | 52/?                                  | 1936:Sectio auswärts.                                             |                                  |                                  |
|         |           |      | 36    | 1936             | S   | re    | 3300                                          | ??                                    | 1937:Status nach 2                                                |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1937             | S   | llpt  | 3850                                          | 55/36                                 | Sectiones Querlage                                                |                                  |                                  |
| 277     | 994/1937  | H.M. |       | 1922             | Z   | re    | ?                                             | 25,5/29/<br>31/17,5/<br>8,5           | EB II.0                                                           |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1924             | Z+  | re    | ?                                             |                                       | 1926:Sectio auswärts.                                             |                                  |                                  |
|         |           |      | 27    | 1925             | Z+  | re    | ?                                             |                                       | 1937:Querlage.                                                    |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1926             | S   | re    | 3750                                          |                                       | Alter der Patientin                                               |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1935             | A   | IV    | --                                            |                                       |                                                                   |                                  |                                  |
|         |           |      | 38    | 1937             | S   | re    | 2480                                          | 49/34                                 |                                                                   |                                  |                                  |
| 278     | 535/1926  | B.A. |       | 1911             | O   | re    | 2500                                          | 25,5/27,5                             | EB II.0                                                           |                                  |                                  |
|         |           |      | 25    | 1912             | S   | re    | 3500                                          | 31,5/18,5                             | 1912:Sectio auswärts.                                             |                                  |                                  |
|         |           |      | 35    | 1922             | S   | re    | 3750                                          | ??                                    | 1922:EB.Sectio auswärts.                                          |                                  |                                  |
|         |           |      | 39    | 1926             | S   | llpt  | 3100                                          | 51/35                                 | 1926:EB.Querlage                                                  |                                  |                                  |
| 279     | 5/1936    | U.R. |       | 1928             | O   | re    | 3850                                          | 28/31/32/<br>20/7,2                   | EB III.0                                                          |                                  |                                  |
|         |           |      | 29    | 1929             | O   | re    | 3000                                          |                                       | 1931:EB.Sectio auswärts                                           |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1931             | S+  | pt    | 5000                                          | ??                                    | 1936:Status post sanatio-<br>nem fistulae vesico<br>vaginalis     |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1933             | A   | V     | --                                            |                                       |                                                                   |                                  |                                  |
|         |           |      | 34    | 1934             | A   | V     | --                                            |                                       |                                                                   |                                  |                                  |
|         |           |      |       | 1936             | S   | re    | 3360                                          | 48/35,5                               |                                                                   |                                  |                                  |
| 280     | 1211/1949 | L.M. |       | 1936             | O   | re    | 3750                                          | 24,5/27,5                             | Relatives Mißverhältnis.                                          |                                  |                                  |
|         |           |      | 28    | 1943             | S   | re    | 3750                                          | 31/18,5/<br>19,5                      | 1943:EB.Sectio auswärts                                           |                                  |                                  |
|         |           |      | 34    | 1949             | S   | llpt  | 4060                                          | 55/36                                 | 1949:Sehr großes Kind;<br>harter Schädel                          |                                  |                                  |
| 281     | 252/1949  | F.E. |       | 1938             | Z   | re    | 3250                                          | 26/30/31/<br>19,5                     | 1941:Sectio auswärts.                                             |                                  |                                  |
|         |           |      | 27    | 1941             | S   | pt    | 4000                                          |                                       | 1949:Drohende Uterusruptur.                                       |                                  |                                  |
|         |           |      | 35    | 1949             | S   | IX    | 1970                                          | 46/33                                 | Ungeheilte Blasen-Bauchwand-<br>fistel, Querlage                  |                                  |                                  |
| 282     | 241/1950  | S.E. |       | 1948             | O+  | re    | 2800                                          | 28,5/31,5                             | 1949:Sectio auswärts                                              |                                  |                                  |
|         |           |      | 29    | 1949             | S+  | re    | 2500                                          | ??                                    | 1950:Status nach Becken-<br>fractur.Leichte Becken-<br>verengung. |                                  |                                  |
|         |           |      | 30    | 1950             | S   | 5pt   | 3150                                          | 50/34                                 |                                                                   |                                  |                                  |

D) Die der Sectio vorangegangenen Geburten per vias naturales.

In dem folgenden Abschnitt werden diejenigen Geburten per vias naturales besprochen, die der Sectio vorausgegangen sind. Dabei hatte in 119 Fällen nur eine Geburt per vias naturales stattgefunden, während es bei 163 Fällen zur mehrfachen Entbindung per vias naturales gekommen war.

1. Eine einzige der Schnittentbindung vorangegangene Geburt per vias naturales.

Das Geburtenmaterial wurde in 2 Hauptgruppen unterteilt: Zur ersten Gruppe wurden gerechnet alle Geburten, bei denen der Partus spontan erfolgte, zur anderen Gruppe jene Fälle, bei denen die Geburt durch vaginal operatives Eingreifen (Zange, Hilfeleistung bei Beckenend- und Querlagen) beendet wurde. Nicht berücksichtigt wurden die Fälle von Perforationen des kindlichen Schädels bei toten Früchten und Frühgeburten unter 2000 g. Bei den 119 Fällen mit einer vorangegangenen Geburt per vias naturales handelt es sich teils um lebensfähige, teils asphyktische Kinder, teils um Totgeburten, die nicht perforiert wurden. Ferner wurden noch diejenigen Fälle gesondert behandelt, bei denen außer einem Partus noch ein oder mehrere Aborte vorausgegangen sind. Ihre Aufteilung ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

Tabelle 1: Übersicht über die 119 Fälle mit einer einzigen der Sectio vorangegangenen Geburt (und Fehlgeburt) per vias naturales.

|                        | Spontangeburt           |                 |               | Kunsthilfe              |                 |               |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|
|                        | Gesamtzahl<br>der Fälle | Kinder<br>leben | Kinder<br>tot | Gesamtzahl<br>der Fälle | Kinder<br>leben | Kinder<br>tot |
| Partus                 | 61                      | 49              | 12            | 36                      | 26              | 10            |
| Partus<br>und<br>Abort | 10                      | 3               | 7             | 12                      | 10              | 2             |
| Fälle zus.             | 71                      | 52              | 19            | 48                      | 36              | 12            |

Wir haben insgesamt 71 Spontangeburt (1. Gruppe) zu verzeichnen. In 61 dieser Fälle war nur ein Spontanpartus der Sectio vorausgegangen. Hiervon leben 49 Kinder und 12 sind tot.

In 10 Fällen fanden wir in der Anamnese außer einer spontanen Geburt noch Fehlgeburten. Es leben hier von insgesamt 10 Kindern 3 und 7 Kinder sind tot. Die Todesursachen der 19 Kinder sind nicht zu eruieren, da die Geburten auswärts stattgefunden hatten.

In 48 Fällen sind Kunsthilfen angewandt worden (2. Gruppe). Dabei hat in 36 Fällen nur ein Partus vor der Sectio stattgefunden. Es leben 26 Kinder und 10 sind tot. In 12 Fällen kamen anamnestisch ausserdem noch ein oder mehrere Aborte vor. Hier leben 10 Kinder und 2 Kinder sind tot.

Die Todesursachen von 11 mittels Kunsthilfe entwickelten Kindern sind ebenfalls nicht zu eruieren, da die Geburten auswärts stattfanden. - In dem einen Fall, in dem eine Obduktion durchgeführt wurde, starb das Kind durch cerebrale Schädigung nach Kopfschwartenzange. (Obduktionsbericht Nr. 895/41).

## 2. Mehrere der Sectio vorangegangene Geburten per vias naturales.

In der weitaus größeren Anzahl unserer insgesamt 282 Fälle, nämlich in 163 = 57,80 % der Fälle hatten die Frauen mehrfach entbunden, ehe eine Sectio erforderlich wurde. Auch hierbei ergibt sich eine Einteilung in mehrere Gruppen:

### 1. Gruppe: Nur Spontanentbindungen.

62 Frauen hatten vor der Sectio mehrmals spontan entbunden.

### 2. Gruppe: Spontanentbindungen und Aborte.

Hier wurde die obige Gruppe nur erweitert durch Hinzunahme von ein oder mehreren Aborten in der Anamnese und zwar in 24 Fällen.

### 3. Gruppe: Spontanentbindungen und Kunsthilfen.

In 40 Fällen hatten jeweils Spontan- und Zangengeburt sowie Manualhilfen stattgefunden.

### 4. Gruppe: Spontanentbindungen, Kunsthilfen und Aborte.

Zu den Punkten der obigen Gruppe kamen noch Fehlgeburten hinzu und zwar bei 7 Müttern.

### 5. Gruppe: Ausschließlich Kunsthilfen.

Die vorangegangenen Geburten waren in 17 Fällen nur vaginale operative Entbindungen.

### 6. Gruppe: Sonderfälle.

Bei 2 Frauen fehlen anamnestische Angaben über die vorausgegangenen Geburten.

7. Gruppe: Perforation des kindlichen Schädels oder eine Embryotomie bei toten Früchten.

In den 11 von 163 Fällen war bei den dem Kaiserschnitt vorangehenden Geburten eine Perforation des kindlichen Schädels oder eine Embryotomie nötig. Erstaunlicherweise geschah die Perforation immer in der Schwangerschaft, die der Gravidität mit Sectio voranging. Diese Fälle sollen deshalb einzeln besprochen werden.

Fall 1: Nr. 21, KrbI. Nr. 666/1932.

Hier besteht ein enges Becken I. Grades. 3 Geburten sind der Sectio vorausgegangen. Die ersten beiden erfolgten spontan. Bei der letzten Geburt wurde eine Perforation des kindlichen Schädels ausgeführt. Aus welcher Indikation ist unbekannt, da alle Entbindungen außerhalb der Klinik stattfanden. Da alle 3 Kinder Totgeburten waren, entschloß man sich nunmehr zur Sectio; außerdem bestand noch eine Prae-eklampsie.

Fall 2: Nr. 24, KrbI. Nr. 292/1931.

Hier besteht nur eine Verengung des Beckens I. Grades. Die ersten beiden Schwangerschaften endeten mit Totgeburten, wobei die erste Geburt spontan und die 2. Geburt durch Perforation des kindlichen Schädels erfolgte. Da dringender Wunsch nach einem lebenden Kind bestand, wurde bei erneuter Gravidität eine Sectio vorgenommen.

Fall 3: Nr. 41, KrbI. Nr. 152/1939.

Dem Kaiserschnitt gingen 7 Schwangerschaften voraus: 3 Zangen-geburten, 1 Abort, 1 Spontanentbindung und 2 Perforationen des kindlichen Schädels jeweils bei Schädellage. Die Kinder wogen 3650 und 3770 g. Die Perforationen wurden ausgeführt wegen intrauterinen Fruchttodes bei engem Becken II. Grades. Bei der nun folgenden Gravidität entschloß man sich deshalb zur Schnitt-entbindung, um das Kind am Leben zu erhalten. Dieses Kind wog 3520 g.

Fall 4: Nr. 43, KrbI. Nr. 836/1937.

Es besteht ein enges Becken II. Grades. Der Sectio gingen 3 Spontangeburt voraus und 1 Gravidität, die durch Perforation beendet wurde. Die Geburten erfolgten außerhalb. Die Ursache ist deshalb unbekannt. Als 5 Jahre später wieder ein

Kind erwartet wurde, entschloß man sich zum Kaiserschnitt, weil ein Mißverhältnis vorhanden war und dringender Kinderwunsch bestand. Dieses Kind war das schwerste unter den Geschwistern und wog 3640 Gramm.

Fall 5: Nr. 44, KrbI. Nr. 385/1935.

5 Schwangerschaften wurden durch Spontanpartus mit lebenden Kindern beendet. Dann erfolgte bei totem Kind eine Perforation des kindlichen Schädels. Das Kind war übertragen (angeblich 4 Wochen post terminum). Die Geburtsgewichte der einzelnen Geschwister waren nicht angegeben. Bei der nächsten Geburt wurde eine Sectio vorgenommen, weil das Kind wieder Übertrager war und ein enges Becken II. Grades bestand. Das Kind wog 3850 g, war 54 cm lang und hatte einen Kopfumfang von 36 cm.

Fall 6: Nr. 50, KrbI. Nr. 597/1949.

Hier besteht ein enges Becken II. Grades. (Conj. vera = 8,4 cm) Es leben 6 Kinder, die alle bis auf das erste (Zange) spontan geboren wurden. Die Geburtsgewichte liegen zwischen 3400 und 4000 g. Bei mehreren Kindern sind die Gewichte nicht mehr bekannt. Als es nach der 6. Gravidität zur Geburt einer toten Frucht kam, mußte eine Perforation des kindlichen Schädels vorgenommen werden. Die Nabelschnur war vorgefallen und das Kind bereits tot. 2 Jahre später erfolgte noch ein Spontanpartus und 9 Jahre danach eine Sectio, deren Indikation auf primärer Wehenschwäche, engem Becken II. Grades, vorzeitigem Blasenprung, mekoniumhaltigem Fruchtwasser und großem Kinde beruhte

Fall 7: Nr. 54, KrbI. Nr. 122/1944.

Es gingen 2 Geburten voraus: die erste mittels Zange, die 2. durch Perforation des Schädels bei totem Kind. Bei der Mutter besteht ein Uterus arcuatus. Alle Kinder befanden sich ursprünglich in Querlage. Beim ersten Kind gelang die äußere Wendung auf den Steiß und die Extraktion am Steiß (Geburtsgewicht 3100 g) mit der Zange. Beim zweiten Kind (3000 g) war weder eine äußere noch eine innere Wendung mehr möglich (verschleppte Querlage). Nach Pulsloswerden der Nabelschnur wurde eine Dissectio foetus und Perforation des nachfolgenden kindlichen Schädels ausgeführt. Da bei der darauffolgenden Schwan-

gerschaft wieder eine Querlage bestand, entschloß man sich nach vergeblichen äußeren Wendungsversuchen zur Sectio. (Geburtsgewicht 3350 g).

Fall 8: Nr. 94, Krb1. Nr. 111/1941.

Das Becken der Mutter weist eine Verengung III. Grades (Conj. vera = 7,4 - 7,5 cm) auf. Das erste Kind (Geburtsgewicht 3000 g) wurde spontan geboren, kann aber durch ein Geburtstrauma nicht laufen und nicht sprechen. Bei der 2. Geburt (Schädellage, Kind 3350 g schwer) bestand ein Nabelschnurvorfal1, intrauteriner Fruchttod, primäre Wehenschwäche, vorzeitiger Blasensprung. Deshalb wurde eine Perforation des kindlichen Schädels vorgenommen. Aus obigen Ursachen heraus und dem verständlichen Wunsch nach einem lebenden Kind wurde die Schwangerschaft durch eine Sectio beendet (Kind 3000 g schwer, 51 cm lang, lebt).

Fall 9: Nr. 233, Krb1. Nr. 622/1950.

Bei der Mutter besteht ein enges Becken I. Grades. (Conj. vera ist nicht angegeben) Der Sectio gingen 2 Geburten voraus, von denen die erste spontan erfolgte. Das Kind (2500 g schwer) lebt. Die kindlichen Schädelmaße sind nicht angegeben. Bei der zweiten Geburt war eine Perforation des kindlichen Schädels notwendig geworden, weil der nachfolgende Kopf des Kindes, das sich in Steißlage befand (4000 g schwer) hängenblieb. Ein und zwei Jahre später erfolgte je eine Sectio, deren Indikation ein Mißverhältnis zwischen der Größe des mütterlichen Beckens und der des Kindes war. Beim Vergleichen der Geburtsgewichte stellt sich heraus, daß diese mit der Zahl der Geburten zunahmen.

Fall 10: Nr. 256, Krb1. Nr. 736/1931.

Nach 2 Spontanentbindungen mit lebenden reifen Kindern und einem Abort folgten bei totem Kind (3600 g schwer) eine Perforation des kindlichen Schädels und zwei Kaiserschnitte mit lebenden Kindern von 3650 und 2600 g. Die Ursachen für die Perforation des intrauterin abgestorbenen Kindes waren enges Becken, vorzeitiger Blasensprung, Nabelschnurumschlingung, vorzeitiges Ablösen der Placenta. Zwei Jahre später wurde bei erneuter Gravidität eine Sectio ausgeführt, weil bei der Mutter

ein enges Becken bestand und das Kind sehr groß war. Ein Jahr danach kam es noch einmal in der Klinik zur Schnittentbindung, da die kindlichen Herztöne auf 72/Min. absanken.

Fall 11: Nr. 275, Krb1. Nr. 1141/1938.

Hier besteht ein enges Becken II. Grades. Das 1. Kind (3500 g) wurde spontan lebend geboren. Es starb am 3. Tage post partum. Die Todesursache ist unbekannt. Beim 2. abgestorbenen Kind (die Entbindung erfolgte außerhalb) mußte der Schädel perforiert werden, weil das Kind tot war und die Mutter fieberte. Bei erneuter Gravidität wurde eine Sectio ausgeführt. Ein Jahr danach fand wieder ein Spontanpartus außerhalb statt. Auch dieses Kind starb kurz nach der Geburt. Die Todesursache ist unbekannt. Als es nach einer erneuten Schwangerschaft zur Geburt kommt, wird eine Sectio ausgeführt, da die kindlichen Herztöne absinken und dringender Kinderwunsch besteht. Das Kind lebt und wiegt 3330 g.

### Conclusio:

In diesem Kapitel über vorangegangene Geburten per vias naturales vor einer Sectio wurde versucht, möglichst ins Detail zu gehen, um alle vorgekommenen Geburtsarten zu differenzieren. Die genaue Detaillierung erschien deshalb wichtig, um zu zeigen, daß es keineswegs nur eine bestimmte Gruppe von Geburtsstörungen ist, die einer nachfolgenden Sectio vorausgegangen ist. Die Aufstellung der Fälle zeigt - wie aus dem nächsten Kapitel der Indikationen zur Sectio zu ersehen ist -, daß keineswegs immer einer vaginalen Geburt wieder ein Partus auf natürlichem Wege folgen muß.

### E) Indikation zur Sectio nach vorausgegangener vaginaler Geburt.

Bei der Zusammenstellung der Fälle nach der jeweiligen Indikation zur Schnittentbindung kommen wir zu einer Einteilung in folgenden Hauptgruppen:

#### A Indikationen bei einmaliger Sectio

I vorwiegend mütterliche

II vorwiegend kindliche

## B Indikationen bei wiederholten Sectiones

I vorwiegend mütterliche

II vorwiegend kindliche

Von den insgesamt 282 untersuchten Fällen entfallen auf A 221 und B 61 Fälle. Die jeweiligen Untergruppen sollen in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit besprochen werden. Hier wiederum sind solche Fälle zu unterscheiden mit nur einer einzigen und in diejenigen mit zwei und mehr Schnittenbindungen.

## A Indikationen bei einmaliger Sectio

Zuerst werden die Fälle mit einmaliger Sectio besprochen. Das sind 221 Fälle = 78,37 % aller untersuchten Fälle. Hiervon fallen unter die

vorwiegend mütterlichen Indikationen 187 Fälle = 84,62 %

und unter die

vorwiegend kindlichen Indikationen 34 Fälle = 15,38 %

### I. Vorwiegend mütterliche Indikationen bei einmaliger Sectio

#### 1.) Enges Becken Nr. 1-100, S. 3-17 der Kasuistik.

Diese Einteilung wurde nach der Größe des mütterlichen Beckens vorgenommen. Dem Häufigkeitsgrade nach steht diese Indikation an erster Stelle. Es sind 100 Fälle = 53,48 % der gesamten 187 Fälle mit mütterlicher Indikation bei einmaliger Sectio nach einer oder mehreren Geburten per vias naturales. Davon entfallen auf das

#### Enge Becken I. Grades

33 Fälle = 33 %.

In 4 Fällen (Nr. 1-4) bestand ausschließlich diese Indikation.

In 29 Fällen waren noch zusätzliche Ursachen maßgeblich beteiligt.

Diese lauteten:

- 5 Fälle Litzmann'sche Obliquität (Nr. 11, 12, 14, 28, 30)
- 4 Fälle Arrhythmische Herztöne (Nr. 15, 16, 29, 33)
- 3 Fälle Nephropathia gravidarum oder Prae-eklampsie (Nr. 19, 21, 32)
- 3 Fälle Nabelschnurvorfall (Nr. 20, 27, 31)
- 2 Fälle abgewichener Kopf (Nr. 5, 10)
- 3 Fälle Querlage (Nr. 7, 9, 26)
- 2 Fälle Placenta praevia (Nr. 13, 18)
- 2 Fälle Totgeburten (bei früheren Geburten) (Nr. 23, 24)
- 1 Fall Auftreten einer Uterusruptur (Nr. 22)
- 1 Fall Dermoidcyste als Geburtshindernis und Naegele'sche Obliquität (Nr. 25)
- 1 Fall Vorzeitige Blutung bei geschlossenem Muttermund und Querlage (Nr. 8)
- 1 Fall Großer Kopf (fronto-occipitaler Umfang = 40 cm) (Nr. 17)
- 1 Fall Primäre Wehenschwäche (Nr. 6)

Von diesen hatte eine Mutter außer den genannten Indikationen noch Multiple Sklerose (Nr. 28) und eine andere ein Vitium cordis (Nr. 30); eine dritte stand in relativ hohem Alter (45 Jahre; alte II. Para). (Nr. 7).

Enges Becken II. Grades

58 Fälle = 58 %

Hier entfallen auf die reine Indikation 15 Fälle (Nr. 34-48) und auf die zusätzliche 43 Fälle. Letztere heißen:

- 7 Fälle Litzmann'sche Obliquität (Nr. 49, 60, 66, 67, 69, 71, 86).
- 1 Fall Naegele'sche Obliquität (Nr. 89).
- 11 Fälle Gefährdete Kinder (Nr. 52, 53, 56, 58, 59, 62, 72, 74, 77, 80, 91).
- 5 Fälle tote Kinder bei früheren Geburten (Nr. 70, 73, 76, 81, 85).
- 3 Fälle Großer Kopf (Nr. 55, 65, 82).
- 4 Fälle Querlage (Nr. 61, 64, 79, 87).
- 1 Fall abgewichener Kopf (Nr. 83).
- 2 Fälle Aufgetretene Uterusruptur (Nr. 68, 84).
- 2 Fälle Uterus arcuatus (Nr. 54, 75).
- 1 Fall Uterus myomatosus (Nr. 78).
- 1 Fall Prophylaktische Sectio (Nr. 90)<sup>+</sup>.
- 1 Fall Primäre Wehenschwäche (Nr. 50)
- 2 Fälle Hoher Gradstand (Nr. 51, 57).
- 1 Fall Steißfußlage (Nr. 63).
- 1 Fall Laesio vesicae post forcipem bei vorangegangener Geburt (Nr. 88).

Enges Becken III. Grades

9 Fälle = 9 %

Fall 1: Nr. 92, Krb1. Nr. 310/1943.

Alle 3 vorausgegangenen Geburten waren Totgeburten. Die Entbindungen fanden auswärts statt. Todesursachen sind nicht angegeben. Um ein lebendes Kind zu erhalten, entschloß man sich zur Sectio. (Conj. vera = 7,5 cm)

Fall 2: Nr. 93, Krb1. Nr. 181/1943.

Die erste Geburt (außerhalb) endete mit einem toten Kind. Das durch die Sectio gewonnene lebende Kind hatte einen Kopfumfang von 40 cm, war also sehr groß. (Conj. vera = 7,5 cm).

-----  
+) Laut Operationsbericht wurde die prophylaktische Sectio ausgeführt, weil ein vorzeitiger Blasensprung die normale Geburtsarbeit in Frage stellte und bei der letzten Geburt durch Wendung und Extraktion mit knapper Not ein lebendes Kind erzielt wurde.

Fall 3: Nr. 94, Krb1. 111/1941.

Bei der ersten Entbindung wurde das Kind (3000 g schwer) spontan und lebend geboren. Es kann aber durch ein Geburtstrauma nicht laufen und nicht sprechen. Bei der 2. Geburt mußte die Frucht perforiert werden, weil sub partu der Foet durch Nabelschnurvorfall abgestorben war. Aus diesem Grund und dem verständlichen Wunsch nach einem lebenden Kind wurde die dritte Schwangerschaft durch einen Kaiserschnitt beendet. (Conj. vera = 7,4 - 7,5 cm).

Fall 4: Nr. 95, Krb1. Nr. 972/1935.

Der Sectio voraus gingen eine Zangen- und zwei Spontangeburt. Die Kinder wogen 2800 g, 2300 g, 3500 g. Das 1. Kind ist nach 1 Jahr gestorben und das 3. tot geboren. Als es am Ende der 4. Schwangerschaft zur Geburt kam, verlangsamten sich die kindlichen Herztöne. Deshalb entschloß man sich zur Schnittentbindung. (Conj. vera 7,25 cm). Das Kind lebt, ist 51 cm lang und 2900 g schwer.

Fall 5: Nr. 95, Krb1. Nr. 633/1933.

Die beiden ersten Graviditäten endeten mit Totgeburten außerhalb. Bei der Mutter bestand ein uterus arcuatus. Das 3. Kind befand sich in Querlage. Deshalb wurde die Sectio ausgeführt. (Conj. vera = 6,7 cm). Das Kind lebt.

Fall 6: Nr. 97, Krb1. Nr. 736/1932.

Das erste Kind wurde mit Hilfe der Zange zuhause entwickelt. Es lebt, wog aber bei der Geburt nur 1750 g. In der 2. Schwangerschaft bestand bei der Mutter eine Nephropathia gravidarum. Hinzu kam vorzeitiger Blasensprung und Symphysensporn (1,1 cm lang), die dann zur Sectio führten. (Conj. vera = 6,9 cm).

Fall 7: Nr. 98, Krb1. Nr. 221/1932,

Die erste Geburt verlief spontan. Das Kind lebt, wog bei der Geburt 2100 g. Da aber bei der Frau ein rachitischer Zwergwuchs bestand und eklamptische Anfälle auftraten, wurde im 8. Monat der Gravidität die Schnittentbindung vorgenommen. Das Kind war unreif (41 cm lang, 1500 g schwer) und starb nach einer Stunde an Lebensschwäche. (Conj. vera = 6,8 cm).

Fall 8: Nr. 99, Krb1. Nr. 640/1928.

Die Frau hatte ein plattrachitisches Becken. Zwei Zangen-geburten waren voraufgegangen. Beide Kinder waren tot. Deshalb wurde die 3. Schwangerschaft durch einen Kaiserschnitt beendet. Das Kind lebt, wiegt 3450 g und ist 53 cm lang. (Conj. vera = 7,1 cm).

Fall 9: Nr. 100, Krb1. Nr. 114/1927.

Die Mutter hat 3 lebende Kinder, die spontan geboren wurden. Die Kinder wogen 2250 g, 2500 g, 2750 g. Nach einem Abort kam es erneut zur Schwangerschaft. Da der Kopf abgewichen war und sich nicht einstellen ließ, wurde eine Sectio vorgenommen. (Conj. vera = 7,4 cm).

## 2.) Placenta praevia: Nr. 101-160 Seite 17-24.

In dieser Gruppe haben wir 60 Fälle = 32,09 %. Den Vorrang nimmt die Placenta praevia centralis ein mit 35 Fällen. Ihr folgen Placenta praevia lateralis mit 11 Fällen und Placenta praevia marginalis mit 9 Fällen. In 5 Fällen fehlen die näheren Bezeichnungen der Placenta praevia.

## 3.) Uterusbedingte Indikationen: Nr. 160-173 Seite 24-26.

Unter dieser Gruppe haben wir 13 Fälle = 6,95 % zusammenfassen können. Die Ursachen davon sind mannigfaltiger Art:

- 3 Fälle Wehenschwäche (Nr. 161-163).
- 4 Fälle Uterus myomatosus (Nr. 164-167).
- 2 Fälle Uterussuptur (Mißverhältnis) (Nr. 168, 169).
- 1 Fall Uterus arcuatus (Nr. 170).
- 1 Fall Tetanus uteri (vorzeitige Placentalösung) (Nr. 171).
- 1 Fall Uterus im Dauertonus (verschleppte Querlage) (Nr. 172)+).
- 1 Fall Prolapsus uteri mit Portioerosion (Nr. 173).

-----

+) Dazu ist aus dem Operationsbericht folgendes zu entnehmen:  
Die Untersuchung bei der Aufnahme ergab: Uterus im Dauertonus, vorzeitiger Blasensprung, Muttermund für 1 Querfinger durchgängig. Trotz Spasmalgin kein Nachlassen des Dauertonus. Muttermund erweitert sich auf zwei Querfinger. Kindsteile nicht zu eruieren. Deshalb Röntgenaufnahme: Dorso-inferiore Querlage, Kind sehr eingeklemmt. Äußere Wendung nicht durchführbar. Vaginale Lösung bedeutet Gefahr für Mutter und Kind. Das Kind lebt.

4.) Eklampsie und Nephropathia gravidarum: Nr.174-180,  
Seite 26-27.

Insgesamt sind es 7 Fälle = 3,75 %. Bei 5 Frauen handelt es sich um eine Nephropathia gravidarum. In 1 Fall trat eine Eklampsie auf. In einem weiteren Fall war eine Praeuraemie als Folge einer malignen Nephrosklerose entstanden, kompliziert durch vorzeitige Placentalösung und Diabetes mellitus.

5.) Vorzeitige Placentalösung: Nr. 184, 185, Seite 27-28.

In dieser Gruppe haben wir nur 2 Fälle = 1,07 %. Bei beiden traten starke Blutungen durch vorzeitige Placentalösung auf. Bei der ersten Mutter waren Kindsteile nicht tastbar und Herztöne nicht hörbar. Das Kind (Frühgeburt Mens VII, 1150 g schwer) war lebend geboren, starb aber kurz nach der Geburt aus unbekannter Ursache. Im zweiten Fall hatte die Frau eine utero-placentare Apoplexie, sekundäre Anämie und dazu eine frische Thrombose des linken Beines. Sie befand sich im 7. Monat der Schwangerschaft. Das Kind wog 1070 g, war 37 cm lang und starb 4 Stunden nach der Geburt an Lebensunfähigkeit, da es laut Obduktionsbericht (77/51) ohne Reifezeichen geboren worden war und eine Atelektase der Lunge bestand.

6.) Status nach Symphysenruptur: Nr. 186, 187, Seite 28.

In zwei Fällen (= 1,07 %) wurde die Indikation zur Sectio gestellt, um die Symphyse nicht wieder zu verletzen. Die Geburtsgewichte betrugen 4050 g und 3350 g, die Größe 52 cm und 50 cm.

7.) Status nach Symphysendehnung: Nr. 188, S. 28.

In diesem einem Falle (= 0,53 %) war das Kind 12 Tage übertragen. Das Kind wog 3800 g und war 56 cm lang.

8.) Status nach Interpositio: Nr. 189, Seite 28.

Es handelt sich um eine Mutter (1 Fall = 0,53 %), bei der außerdem eine Tuberculosis pulmonalis bestand. Das Kind befand sich in Querlage. 10 Tage ante terminum wurde die Sectio ausgeführt. Das Kind war 3350 g schwer und 50 cm lang.

9.) Narbenstriktur der Vagina nach Sturzgeburt: Nr. 190.

1 Fall (=0,53 %). Narbenstriktur und geschlossener Muttermund waren der Anlaß, bei dieser Frau die Sectio vorzunehmen. Das Kind war 52 cm lang und 3000 g schwer.

## II. Vorwiegend kindliche Indikationen bei einmaliger Sectio.

### 1.) Relatives Mißverhältnis Nr. 191-203, Seite 29-30.

Von den insgesamt 34 Fällen mit vorwiegend kindlicher Indikation bei einmaliger Sectio haben wir 13 Fälle = 38,24 %, in denen das mütterliche Becken normale Maße aufweist, aber das Kind relativ groß ist. Die Geburtsgewichte der Sectiokinder liegen zwischen 6 und 9,5 Pfund. Ihre Kopfumfänge differieren zwischen 35 und 40 cm. Vergleicht man in diesen Fällen die Geburtsgewichte der vorausgegangenen Geburten mit denen der Kinder, die durch Kaiserschnitt entbunden wurden, ob Gewichtszunahmen zu verzeichnen sind, so kommt man zu folgendem Ergebnis:

In 11 Fällen wurden Zunahmen des Gewichtes festgestellt zwischen 100 g und 1250 g. In einem Fall wog das Kaiserschnittkind 50 g weniger als das erste (Nr. 193). In einem Fall (Nr. 203) sind 7 Spontangeburt voraufgegangen. Die jeweiligen Geburtsgewichte zeigen dabei Schwankungen nach oben und unten. An der Indikation zur Sectio waren außer einem relativen Mißverhältnis auch noch andere Faktoren beteiligt: Schwankende Herztöne bei engem Muttermund, vorzeitiger Blasensprung und Cyste der Tubenampulle. Das Kind war 56 cm lang, wog 4000 g und hatte einen Kopfumfang von 38 cm.

### 2.) Nabelschnurvorfall Nr. 204-210, Seite 30-31.

Bei 7 Kindern = 20,58 % war die Nabelschnur vorgefallen und dabei die Herztöne abgesunken.

### 3.) Nabelschnurumschlingung Nr. 211, Seite 31.

1 Kind (2,94 %) hatte die Nabelschnur doppelt und fest um den Hals geschlungen. Die Herztöne sanken ab auf 80 Schläge/Min. bei einem querringergroßen Muttermund. Die Blase sprang bei der Operation. Durch die Schnittentbindung wurde ein lebendes, 53 cm langes und 3050 g schweres Kind entwickelt.

### 4.) Habituelles Absterben Nr. 212-216, Seite 31-32.

In 5 Fällen (= 14,71 %) wurde ein Kaiserschnitt gemacht, weil bei den vorausgegangenen Geburten die Kinder abgestorben waren. In 2 Fällen (Nr. 212 und 214) je 3 tote Kinder und in den übrigen 3 Fällen je 2 tote Kinder. Die Todesursachen sind nicht angegeben; die der Sectio vorangehenden Geburten haben auswärts stattgefunden.

4 Sectiokinder leben. Nur eines (Nr. 213) ist 4 Stunden nach der Geburt gestorben. Es war 4 Wochen ante terminum geboren worden, war 50 cm lang und wog 2600 g. Die Obduktion (Path. Institut der Universität Würzburg) ergab: Struma congenita, größtenteils atelektatische Lungen.

5.) Alteration der kindlichen Herztöne: Nr. 217-221, Seite 32.

Bei 5 Kindern = 14,71 % wurden die Herztöne unregelmäßig, bzw. erhöhten oder verminderten ihre Frequenz. Dazu war in einem Fall (Nr. 218) der Muttermund noch kaum geöffnet und die Herztöne zwischen 104-168 Schlägen/Min. Im zweiten Fall (Nr. 219) kam ein hoher Gradstand hinzu (Herztöne 120-176/Min.). Im dritten Fall (Nr. 220) kam es zu einem vorzeitigen Blasensprung mit Mekoniumabgang (Herztöne 160-180/Min.). Im vierten Fall (Nr. 217) verschlechterten sich die Herztöne bei rascher Wehenfolge und vorzeitigem Blasensprung (Herztöne 180/Min.). Im letzten Fall (Nr. 221) war die Frau eine alte II.-Gebärende. Die erste Geburt hatte vor zehn Jahren als Zangengeburt stattgefunden. Als sich die kindlichen Herztöne verlangsamten und arhythmisch wurden sowie die medikamentöse Einleitung ohne Erfolg war, entschloß man sich zur Sectio. Das Kind war 51 cm lang und 3270 g schwer.

6.) Lage-Anomalien: Nr. 181-183, Seite 27.

In drei Fällen = 8,82 % handelt es sich um eine Lage-Anomalie. In einem Fall (KrbL. Nr. 96/1950) wurden bei allen vier Geburten die Kinder in Steißlage außerhalb geboren, darunter zwei Totgeburten. Das durch Sectio geborene, lebende, 3410 g schwere, 51 cm lange Kind war außerdem noch angeblich 56 Tage übertragen. Im zweiten Fall (KrbL. Nr. 546/1952) war der Schnittentbindung eine Zangengeburt vorausgegangen. Die Sectio wurde dann ausgeführt, weil eine Litzmann'sche Obliquität vorlag. Das Kind wog 4050 g. Im dritten Fall (KrbL. Nr. 610/1947) war die Mutter sehr adipös. Das Kind befand sich in Querlage, wog 3400 g und war 55 cm lang.

### Conclusio:

Man kommt zu folgendem Ergebnis: In der Mehrzahl der Fälle bei einmaliger Sectio (187 von 221) wurde die Indikation zum Kaiserschnitt aus mütterlicher Ursache herausgestellt, die somit in der Häufigkeit den ersten Platz einnimmt. Hierbei wiederum liegt

in den meisten Fällen ein enges Becken vor, das aber nicht die einzige Anzeige zur Sectio darstellt. Es kommen vielmehr noch folgende Indikationen in Betracht: Mißverhältnis, Placenta praevia, Uterus-ruptur, Eklampsie, Lageanomalien oder arhythmische kindliche Herztöne. Da also bei der Sectio - gegenüber der früheren Geburt - zum größten Teil völlig neue geburtshilfliche Situationen auftreten können, darf man nicht erwarten, daß eine vaginale Geburt unbedingt bei der nächsten Gravidität einen Kaiserschnitt ausschließt.

#### B Indikationen bei wiederholten Sectiones.

Es werden nunmehr die Fälle bei wiederholter Sectio besprochen. Dabei handelt es sich um 61 Fälle = 21,63 % aller untersuchten Fälle. Davon entfallen auf

vorwiegend mütterliche Indikationen 32 Fälle = 52,46 %  
und auf

vorwiegend kindliche Indikationen 17 Fälle = 27,87 %

Die restlichen 12 Fälle = 19,67 % müssen gesondert betrachtet werden, weil ein Kaiserschnitt in einem auswärtigen Krankenhaus ausgeführt wurde.

In 55 Fällen besteht bei der Mutter ein enges Becken. Da diese Ursache allein nicht immer für die Kaiserschnittindikation maßgebend war, wurden diese Fälle aufgeteilt nach ihren zusätzlichen Indikationen. So kommen wir wieder zu den gleichen Gruppen wie oben. Unter diese Aufteilung fallen auch die 6 Fälle mit normalen Beckenmaßen der Mutter.

#### I. Vorwiegend mütterliche Indikationen bei wiederholten Sectiones.

In den oben angegebenen 32 Fällen wurden 2 bzw. 3 Kaiserschnitte ausgeführt; es sind folgende Indikationen zu verzeichnen:

21 Fälle enges Becken (Nr. 222-232, 244-248, 265-269).

6 Fälle enges Becken, Lageanomalien (Nr. 233-238).

5 Fälle mit wechselnden mütterlichen Indikationen bei den einzelnen Kaiserschnitten.

Fall 1: 1. Sectio: Enges Becken, Placenta praevia  
(Nr. 239) 2. Sectio: Enges Becken, Litzmann'sche Obliquität  
3. Sectio: Enges Becken, Placenta praevia

- Fall 2: 1. Sectio: Enges Becken, Uterus bicornis, Querlage.  
(Nr.240) 2. Sectio: Enges Becken, Uterus bicornis, Querlage.  
3. Sectio: Enges Becken, Uterus bicornis, Placenta praevia.

- Fall 3: 1. Sectio: Enges Becken, Status post Laesionem vaginae  
(Nr.241) post forcipem  
2. Sectio: s. 1. Sectio und dazu abgewichene Steißlage  
3. Sectio: s. 1. Sectio, Status post 2 sectiones wegen  
engen Beckens.

- Fall 4: 1. Sectio: Placenta praevia  
(Nr.242) 2. Sectio: Uterusruptur.

- Fall 5: 1. Sectio: Placenta praevia  
(Nr.243) 2. Sectio: Status post sectionem und Myomenucleation  
(bei der 1. Sectio).

Bei den Fällen 4 und 5 besteht kein enges Becken.

## II. Vorwiegend kindliche Indikationen bei wiederholten Sectiones.

Es handelt sich in dieser Gruppe um 17 Fälle, in denen 2 bzw.

3 Kaiserschnitte ausgeführt wurden. Davon bestent in 2 Fällen  
(Nr. 249, 270) kein enges Becken. Die Indikationen verteilen sich  
wie folgt:

2 Fälle: Relatives Mißverhältnis bei großem Kind (Nr. 249, 270)

1 Fall : Dringender Kinderwunsch, da erstes Kind durch Geburtstrauma  
geistesschwach und zweites Kind nach 6 Monaten gestorben  
(Nr. 250).

14 Fälle mit wechselnden kindlichen Indikationen bei den einzelnen  
Schnittentbindungen.

3 Fälle: 1. Sectio: Mißverhältnis  
(Nr.252,254,256) 2. Sectio: Mißverhältnis, Alteration der kindlichen  
Herztöne in der Eröffnungsperiode

2 Fälle: 1. Sectio: Alteration der kindlichen Herztöne in  
(Nr.253,255) der Eröffnungsperiode  
2. Sectio: Mißverhältnis

1 Fall: 1. Sectio: Wiederholtes Absinken der Herztöne in  
(Nr.251) der Eröffnungsperiode  
2. Sectio: Enges Becken, dringender Kinderwunsch

1 Fall: 1. Sectio: Geburtsstillstand bei relativem Mißver-  
(Nr. 257) hältnis, Kopf auf Beckeneingang aufge-  
preßt, Wehensturm  
2. Sectio: Absinkende Herztöne, Mißverhältnis,  
frühzeitiger Blasensprung

1 Fall: 1. Sectio: Alteration der Herztöne  
(Nr.258) 2. Sectio: Geburtsstillstand, vorzeitiger Blasen-  
sprung, leichte Wehen, Patientin  
wünscht Sectio

3 Fälle: 1. Sectio: Habituelles Absterben des Kindes  
(Nr.259,261,262) 2. Sectio: Mißverhältnis

- 1 Fall: 1. Sectio: Habituelles Absterben des Kindes  
(Nr.260) 2. Sectio: Mißverhältnis  
3. Sectio: Mißverhältnis
- 1 Fall: 1. Sectio: Mißverhältnis, habituelles Absterben des Kindes  
(Nr.263) 2. Sectio: Mißverhältnis, Alteration der Herztöne in der  
Eröffnungsperiode
- 1 Fall: 1. Sectio: Unregelmäßige Herztöne in der Eröffnungsperiode  
(Nr.264) und enges Becken  
2. Sectio: Enges Becken, dringender Kinderwunsch

Betrachtung der Fälle, in denen ein Kaiserschnitt in einem auswärtigen Krankenhaus ausgeführt wurde.

In 12 Fällen waren die Indikationen für einen von zwei bzw. drei Kaiserschnitten nicht zu eruieren, da dieser in einem auswärtigen Krankenhaus ausgeführt worden war. In 11 dieser Fälle bestand bei der Frau ein enges Becken, in einem Fall (Nr. 281) waren die Beckenmaße normal. Die Indikationen zu den bei uns durchgeführten Sectiones (in diesen Fällen) waren wie folgt:

- Fall 1 1. Sectio: auswärts  
(Nr.271) 2. Sectio: Enges Becken, Mißverhältnis, vorzeitiger Blasen-  
sprung, Status nach Forceps und Sectio
- Fall 2 1. Sectio: auswärts  
(Nr.272) 2. Sectio: Enges Becken, primäre Wehenschwäche, vorzei-  
tiger Blasensprung, Mißverhältnis
- Fall 3 1. Sectio: auswärts  
(Nr.273) 2. Sectio: Enges Becken, dringender Kinderwunsch, da die  
beiden ersten Kinder gestorben sind.
- Fall 4 1. Sectio: auswärts  
(Nr.274) 2. Sectio: Enges Becken, Mißverhältnis
- Fall 5 1. Sectio: auswärts  
(Nr.275) 2. Sectio: Enges Becken, absinkende Herztöne
- Fall 6 1. Sectio: Enges Becken, Mißverhältnis  
(Nr.276) 2. Sectio: auswärts  
3. Sectio: Enges Becken, Querlage
- Fall 7 1. Sectio: auswärts  
(Nr.277) 2. Sectio: Enges Becken, Querlage
- Fall 8 1. Sectio: auswärts  
(Nr.278) 2. Sectio: auswärts  
3. Sectio: Enges Becken, Querlage
- Fall 9 1. Sectio: auswärts  
(Nr.279) 2. Sectio: Enges Becken, Status post sanationem fistulae  
vesico-vaginalis
- Fall 10 1. Sectio: auswärts  
(Nr.280) 2. Sectio: Enges Becken, sehr großes Kind, harter Schädel  
(4060 g, 55 cm lang, 36 cm Kopfumfang)

- Fall 11 1. Sectio: auswärts  
(Nr.281) 2. Sectio: Drohende Uterusruptur bei pathologischer Ausladung der Uteruswand, ungeheilte Blasenbauchwandfistel, Querlage
- Fall 12 1. Sectio: auswärts  
(Nr.282) 2. Sectio: Leichte Beckenverengung, Status nach Beckenfraktur

### Conclusio:

Zum Schluß sei bemerkt, daß in 61 von 282 Fällen der Kaiserschnitt wiederholt ausgeführt werden mußte. Etwa ein Drittel dieser Fälle läßt eine von der ersten Indikation zur Sectio verschiedene geburtshilfliche Situation als Indikation für die wiederholte Sectio erkennen. Die Indikationen sind in der Mehrzahl der Fälle mütterlicher Art; doch kann man aus dem obigen ersehen, daß die Indikationen bei wiederholten Kaiserschnitten hierbei häufig wechseln. - Eine vaginale Erstgeburt bürgt ebenso wenig für eine Wiederholung einer späteren Geburt per vias naturales wie eine Sectio einen erneuten Kaiserschnitt nach sich ziehen muß.

### F) Postoperativer Verlauf für Mutter und Kind

Betrachtet man, wie sich die Schnittentbindung für Mutter und Kind auswirkt, so kommen wir zu nachstehenden Feststellungen:

Von den 282 Fällen starben 19 Frauen = 6,74 % und 20 Kinder = 7,09 %.

I. Die Todesursachen bei den Müttern verteilen sich wie folgt:

Es starben an

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Herz- und Kreislaufversagen | 5 Frauen = 26,30 % (Nr. 30, 84, 165, 189, 214)        |
| 2. Peritonitis                 | 7 Frauen = 36,95 % (Nr. 15, 17, 32, 66, 70, 124, 128) |
| 3. Eklampsie                   | 2 Frauen = 10,50 % (Nr. 69, 98)                       |
| 4. Sepsis                      | 1 Frau = 5,25 % (Nr. 132)                             |
| 5. Embolie                     | 1 Frau = 5,25 % (Nr. 91)                              |
| 6. Anämie                      | 1 Frau = 5,25 % (Nr. 152)                             |
| 7. Uterusruptur                | 1 Frau = 5,25 % (Nr. 22)                              |
| 8. Urämie                      | 1 Frau = 5,25 % (Nr. 180)                             |

Ursächliche Zusammenhänge zwischen Indikationsstellung zur Sectio und dem Tod der Frauen finden wir nur in einigen Fällen:

| Indikation   |         | Todesursache |
|--------------|---------|--------------|
| Praeuraemie  | 1 Fall  | Uraemie      |
| Uterusruptur | 1 Fall  | Verblutung   |
| Eklampsie    | 2 Fälle | Eklampsie    |

## II. Die perinatalen Todesursachen der Kinder.

20 Kinder sind entweder vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben.

Es starben an

|                                         |            |                                                                    |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Hypoplasie der Lungen                | 1 Fall =   | 5 % (Nr. 78)                                                       |
| 2. Struma congenita mit Trachealstenose | 3 Fälle =  | 15 % (Nr. 38, 152, 213)                                            |
| 3. Unreife (unter 2000 g )              | 4 Fälle =  | 20 % (Nr. 184, 185, 239, 240)                                      |
| 4. Obduktionsbefund fehlt               | 12 Fälle = | 60 % (Nr. 22, 68, 98, 108, 110, 111, 150, 168, 169, 171, 180, 220) |

In 10 Fällen waren die Foeten schon intrauterin abgestorben. Die Sectio war ausgeführt worden, weil entweder eine Uterusruptur (4 Fälle, Nr. 22, 68, 168, 169) oder eine Placenta praevia (4 Fälle, Nr. 108, 110, 150, 152) und in einem Fall (184) eine vorzeitige Placentalösung bestand. Im 10. Fall (38) war ein Mißverhältnis bei enge Becken vorhanden. Dieses Kind war apnoisch geboren. Laut Obduktionsbericht Nr. 272/48 bestand eine Struma congenita, Stenose der Trachea, Atelektase der Lunge und Asphyxie. Bei den ersten 7 Fällen fehlt der Obduktionsbericht. Im 8. Fall (152) bestand eine Struma congenita mit Trachealstenose (Obduktionsbefund 421/30). Im 9. Fall war der Foet unreif, Mens VII (Obduktionsbefund 426/50). (184)

In 10 Fällen starben die Kinder post partum. Nach den Todesursachen handelt es sich dabei um einen Fall (Nr. 78) mit Hypoplasie der Lunge und fehlenden Reifezeichen (Obduktionsbefund 3/33). Die Indikation zur Sectio lautete hier: Uterus myomatosus, Querlage.

In 1 Fall (Nr. 213) bestand eine Struma congenita mit atelektatischen Lungen (Obduktionsbefund 292/44). Die Indikation zur Sectio war habituelle Totgeburten, frequente Herztöne in der Eröffnungsperiode. In 3 Fällen (Nr. 185, 239, 240) war laut Obduktionsbefund (77/51, 193/51, 412/43) das Kind unreif. Alle 3 Kinder waren Frühgeburten. Die Indikation zur Sectio lautete: vorzeitige Placentalösung mit Apoplexia utero-placentaris und 2 mal Placenta praevia.



| Indikation   |         | Todesursache |
|--------------|---------|--------------|
| Praeuraemie  | 1 Fall  | Uraemie      |
| Uterusruptur | 1 Fall  | Verblutung   |
| Eklampsie    | 2 Fälle | Eklampsie    |

## II. Die perinatalen Todesursachen der Kinder.

20 Kinder sind entweder vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben.

Es starben an

- |                                         |            |                                                                    |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Hypoplasie der Lungen                | 1 Fall =   | 5 % (Nr. 78)                                                       |
| 2. Struma congenita mit Trachealstenose | 3 Fälle =  | 15 % (Nr. 38, 152, 213)                                            |
| 3. Unreife (unter 2000 g)               | 4 Fälle =  | 20 % (Nr. 184, 185, 239, 240)                                      |
| 4. Obduktionsbefund fehlt               | 12 Fälle = | 60 % (Nr. 22, 68, 98, 108, 110, 111, 150, 168, 169, 171, 180, 220) |

In 10 Fällen waren die Foeten schon intrauterin abgestorben.

Die Sectio war ausgeführt worden, weil entweder eine Uterusruptur (4 Fälle, Nr. 22, 68, 168, 169) oder eine Placenta praevia (4 Fälle, Nr. 108, 110, 150, 152) und in einem Fall (184) eine vorzeitige Placentalösung bestand. Im 10. Fall (38) war ein Mißverhältnis bei enge Becken vorhanden. Dieses Kind war apnoisch geboren. Laut Obduktionsbericht Nr. 272/48 bestand eine Struma congenita, Stenose der Trachea, Atelektase der Lunge und Asphyxie. Bei den ersten 7 Fällen fehlt der Obduktionsbericht. Im 8. Fall (152) bestand eine Struma congenita mit Trachealstenose (Obduktionsbefund 421/30). Im 9. Fall war der Foet unreif, Mens VII (Obduktionsbefund 426/50). (184)

In 10 Fällen starben die Kinder post partum. Nach den Todesursachen handelt es sich dabei um einen Fall (Nr. 78) mit Hypoplasie der Lunge und fehlenden Reifezeichen (Obduktionsbefund 3/33). Die Indikation zur Sectio lautete hier: Uterus myomatosus, Querlage.

In 1 Fall (Nr. 213) bestand eine Struma congenita mit atelektatischen Lungen (Obduktionsbefund 292/44). Die Indikation zur Sectio war habituelle Totgeburten, frequente Herztöne in der Eröffnungsperiode. In 3 Fällen (Nr. 185, 239, 240) war laut Obduktionsbefund (77/51, 193/51, 412/43) das Kind unreif. Alle 3 Kinder waren Frühgeburten. Die Indikation zur Sectio lautete: vorzeitige Placentalösung mit Apoplexia utero-placentaris und 2 mal Placenta praevia.

Außer den 7 fehlenden Obduktionsbefunden bei den intrauterin abgestorbenen Kindern, haben wir in 5 Fällen (Nr. 98, 111, 171, 180, 220) bei den post partum abgestorbenen Kindern keinen Obduktionsbefund. In 2 von diesen Fällen (Nr. 98, 180) waren die Kinder unreif (Frühgeburten). Die Indikationen zur Sectio waren folgende: 1.) Enges Becken III.°, Eklampsie, 2.) Placenta praevia, 3.) Tetanus uteri, partielle Ablösung der Placenta, absinkende Herztöne, 4.) Diabetes mellitus, maligne Nephrosklerose, Praeuraemie, vorzeitige Placentalösung. 5.) Schwankende Herztöne, vorzeitiger Blasenprung, Mekoniumabgang.

Ziehen wir von den 20 toten oder gestorbenen Kindern die 7 unreif geborenen ab, so bleiben noch als gereinigte Mortalität 13 Kinder = 4,68 %. Diese 7 unreifen Kinder wogen unter 2000 g .

In 4 Fällen sind Mutter und Kind gestorben:

Fall 1 (Nr. 22, KrbL. Nr. 418/1932):

Das Kind war bereits intrauterin abgestorben. Bei der Mutter bestand eine Uterusruptur und Eklampsie sub partu. Bei Mutter und Kind fehlt der Obduktionsbefund.

Fall 2 (Nr. 98, KrbL. Nr. 221/1932):

Bei der Mutter war Eklampsie aufgetreten. Das Kind war unreif und starb 1 Stunde nach der Geburt. Die Mutter starb im eklamptischen Anfall.

Fall 3 (Nr. 152, KrbL. Nr. 543/1930):

Es lag eine Placenta praevia vor. Die Todesursache der Mutter war Anaemie, die des Kindes Struma congenita mit Trachealstenose und Asphyxie. (Obduktionsbefund Nr. 421/30).

Fall 4 (Nr. 180, KrbL. Nr. 695/1951):

Bei der Mutter bestand eine Schwangerschaftsnephrose mit Praeuraemie. Die Mutter starb an Uraemie, das Kind lebte noch 36 Stunden. Die Ursache des Todes ist unbekannt (Obduktionsbefund für die Mutter Nr. 279/51, für das Kind fehlt dieser).

### Conclusio:

Bei der Beobachtung des postoperativen Verlaufes für Mutter und Kind können wir sagen, daß die Sterblichkeitsziffer bei den

Frauen mit 6.74 % und den Kindern mit 7,09 % (ungereinigt) relativ hoch liegt. Betrachtet man bei den Müttern die Ursache des Todes, so findet man allerdings nur in 4 Fällen einen Zusammenhang zwischen dieser und der Indikationsstellung zur Schnittentbindung. Eine Frau mit Praeuraemie (Nr. 180) starb an Uraemie, (der einzige mütterliche Todesfall seit 1947) eine Frau mit Uterusruptur verblutete (Nr. 22) und letztlich starben 2 Frauen (Nr. 69, 98) im eklamptischen Anfall, nachdem die Eklampsie schon vor der Sectio aufgetreten war.

Suchen wir nach den Todesursachen der Kinder, so findet man: 10 (von 20) waren intrauterin abgestorben. Bei einem Kind bestand eine Hypoplasie der Lunge. (Nr. 78). In den meisten anderen Fällen war die Frucht geschädigt durch Uterusruptur (Nr. 22, 68, 168, 169) oder stärkere Blutung bei Placenta praevia (Nr. 108, 110, 150, 152) und vorzeitiger Placentalösung (Nr. 184). Bei 3 Kindern (Nr. 38, 152, 213) bestand eine Struma congenita mit Trachealstenose. Ein Teil der Kinder (7 von 20) (Nr. 78, 98, 180, 184, 185, 239, 240) starb an Lebensunfähigkeit. Diese 7 Kinder waren Frühgeburten unter 2000 g. Rechnet man diese 7 Kinder von den insgesamt 20 gestorbenen ab, so liegt die kindliche Mortalität nur noch bei 4,68 %. Bei insgesamt 12 Fällen fehlt der Obduktionsbefund.

### G) Zusammenfassung.

In einem Zeitraum von 28 Jahren (1925-1952) fanden in der hiesigen Klinik 32038 Geburten statt. Davon wurden 282 Fälle = 0,88 % eingehend betrachtet, bei welchen eine Schnittentbindung nach vorausgegangener Geburt per vias naturales vorgenommen worden war. Dabei zeigte sich:

1. a) In 119 Fällen war der Sectio nur eine Geburt auf natürlichem Wege vorausgegangen. Diese war in 71 Fällen eine Spontangeburt und in 48 Fällen eine Geburt mit Kunsthilfe. Dabei sind 88 Kinder lebend und 21 tot geboren worden.
- b) In 163 Fällen wurden die Frauen vor der Sectio mehrfach vaginal entbunden, teils spontan, teils vaginal operativ, ehe eine Sectio erforderlich wurde.
2. In 221 Fällen hat nur eine einzige Sectio nach ein- oder mehrmaliger Geburt per vias naturales stattgefunden, deren Indikation
  - a) in 187 Fällen vorwiegend mütterlicher Art und
  - b) in 34 Fällen vorwiegend kindlicher Art war.
3. Bei 61 Frauen war mehrmals ein Kaiserschnitt nach vorausgegangener vaginaler Geburt notwendig geworden: In 55 Fällen besteht bei der Mutter ein enges Becken. Die zusätzlichen Indikationen sowie die Indikationen bei den Frauen mit normalem Becken in 6 Fällen verteilen sich wie folgt:
  - a) Vorwiegend mütterliche in 32 Fällen
  - b) Vorwiegend kindliche in 17 FällenIn 12 Fällen wurde einer der Kaiserschnitte in einem auswärtigen Krankenhaus vorgenommen.
4. Die Auswirkungen der Schnittentbindungen: postoperativer Verlauf für Mutter und Kind bringen folgendes Ergebnis: Von den 282 Fällen starben 19 Frauen = 6,74 % und 20 Kinder = 7,09 %; gereinigte Mortalität 13 Kinder = 4,68 %. nach Abzug der 7 Kinder unter 2000 g

Abschließend können wir sagen: So wenig wie einmal eine Sectio immer eine Sectio bedeutet, so stellen wir fest, daß einer Geburt per vias naturales nicht immer eine vaginale Geburt folgen muß. Jede Geburt ist eine individuelle Angelegenheit der Gebärenden und des Kindes. Es ist nicht möglich, aus der Ähnlichkeit vieler Geburten Regeln abzuleiten, die im Einzelfall eine sichere Prognosestellung erlauben und somit die Therapie in jedem Fall erleichtern.

Hiermit möchte ich Herrn Professor Dr. med. K. BURGER für die freundliche Überlassung des Themas sowie für seine wertvollen Ratschläge und seine Unterstützung bei der Anfertigung dieser Arbeit recht herzlich danken.

Ebenso möchte ich Herrn Privatdozenten Dr. L. NEUHAUS meinen besonderen Dank aussprechen für seine freundliche Anleitung und Hinweise bei der Abfassung der Arbeit.

### Literaturverzeichnis

- Naujoks      Deutsche Kaiserschnittstatistik  
1938, Arch. Gynäk. 173 (1942)
- Pauwens      Zbl. Gynäk. 69, 110 (1947)
- Winter      D. allgem. dt. Kaiserschnittstatistik  
v. 1928, Zbl. Gynäk. (1929) 1874-1883.



## Lebenslauf

Am 26. Juni 1925 wurde ich als Tochter des Studienrates Raimund Hirschberg und seiner Ehefrau Maria, geb. Schwethelm in Erfurt geboren.

Von 1931 - 1935 besuchte ich die Volksschule in Oberhausen und anschließend die Oberschule für Mädchen bis 1943. Durch die Kriegsverhältnisse (Evakuierung) gezwungen, setzte ich den Schulbesuch fort an der Königin-Luise-Oberschule in Erfurt und bestand dort am 3. Februar 1944 die Reifeprüfung.

Es folgten ein Jahr Arbeits- und Kriegshilfsdienst. Von Juni bis Dezember 1945 arbeitete ich in der Krankenpflege als Praktikantin und Rote-Kreuz-Helferin auf der chirurgischen Abteilung des St. Martini-Krankenhauses in Duderstadt/Eichsfeld.

Durch die Nachkriegsverhältnisse bedingt konnte ich an keiner Universität immatrikulieren. Deshalb besuchte ich von 1946 bis 1948 die Reichenbach-Schule für medizinisch-technische Assistentinnen in Göttingen. Im März 1948 legte ich mein Staatsexamen als medizinisch-technische Assistentin ab.

Mein Medizinstudium konnte ich endlich im Wintersemester 1948/49 an der Universität Münster beginnen und dort im Februar 1952 die ärztliche Vorprüfung ablegen. Nach dem Sommersemester 1952 wechselte ich zur Universität Innsbruck bis zum Sommersemester 1953, um dann mein Studium an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg fortzusetzen und zu beenden. Am 19.12.1955 legte ich die ärztliche Prüfung ab.

Die Pflichtassistentenzeit begann ich am 1. Februar 1956 an der Universitäts-Frauenklinik Würzburg. Nach 5 Monaten wechselte ich zur inneren Abteilung des St. Josef-Hospitals nach Oberhausen-Sterkrade, wo ich noch tätig bin.

Ich versichere ehrenwörtlich, daß ich die vorliegende Arbeit selbständig verfaßt und außer der angegebenen Literatur keine weiteren Hilfsquellen benutzt habe.

Ich versichere ehrenwörtlich, daß ich bisher von keiner anderen Seite ein Dissertationsthema zur endgültigen Bearbeitung erhalten habe.

Ruth Hirschberg.









